



81. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 06.07.2020 09:47 - Zaključeno



V vinogradih je potrebno še naprej izvajati preventivne varstvene ukrepe za preprečevanje novih okužb in širjenja glivičnih bolezni. Prirast zelenih delov vinske trte je zelo intenziven, zato je potrebno škropljenja še naprej opravljati v rednih približno 10 dnevni časovnih intervalih. Pred okužbami s **peronosporo** je potrebno zavarovati predvsem mlade liste na vrhovih in zalistnikih. Za naslednje škropljenje še vedno priporočamo uporabo fungicidov s kombiniranim kontaktnim in sistemskim oz. polsistemskim načinom delovanja kot so

Acrobat MZ WG, Ampexio, Armetil M, Curzate M 72,5 WG, Cymbal, Daimyo F, Electis 75 WG, Emendo F, Enervin, Equation pro, Folpan Gold, Fortuna gold, Forum MZ WG, Forum star, Fudan Gold, Magma Triple WG, Mikal Flash, Mikal premium F, Mildicut, Momentum F, Momentum trio, Moximate 725 WG/ WP, Moximate plus, Orvego, Pergado MZ/D/F, Profilux, Profiler, Reboot, Revus, Ridomil gold MZ pepite, Sanvino, Sfinga extra WDG Tanos 50 WG, Twingo, Valis F/ M, Videryo F, Vincya F. ipd. Razvijajoče se grozde je potrebno zavarovati pred **oidijem** z uporabo enega od pripravkov kot so **Baltazar, Collis, Custodia, Domark 100 EC, Dynali, Folicur EW 250 Luna experience, Luna max, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo, Orius 25 EW, Prosper CS 300 Sercadis, Score 250 EC, Spirox D, Star tebukonazol, Systhane 20 EW, Tebusha 25% EW, Talendo extra, Topas 100 EC, Topaze, Unicorn ali Vivando.** Uporabite lahko tudi pripravka **Cabrio top** ali **Universalis**, ki hkrati učinkujeta tudi proti peronospori. Za zatiranje oidija škropilni brozgi dodajte tudi **žveplov pripravek** v zmanjšanem odmerku. V primeru pojava oidija uporabite katerega od pripravkov s kurativnim delovanjem kot sta **Karathane gold** ali **Kusabi 300 SC** in škropljenje po treh do petih dneh ponovite.

Pri nekaterih sortah grozdni že prehajajo v razvojno fazo BBCH 77 (začetek dotikanja jagod). Preden se jagode v grozdih strnejo, je smiselno opraviti škropljenje proti **sivi grozdi plesni – botritisu**. Uporabite lahko katerega od za ta namen registriranih pripravkov oz. botriticidov kot so **Cantus, Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Scala, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500** ali **Zenby**. Uporabite lahko tudi pripravke: **Amylo-X, Botector** ali **Serenade ASO** (le za namizno grozdje), dovoljeni so tudi v ekološki pridelavi. Nanos botriticidov lahko opravite le v območju grozdov in temu ustrezno prilagodite tudi odmere pripravkov ter količino vode.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!

Datum objave obvestila: 06.07.2020 09:47

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Novljan Matic

Pripravil: **Matic Novljan, Primož Žigon, Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

