

85. VARSTVO JAGODIČJA - 16.07.2020 08:32 - Zaključeno



V nasadih ameriških borovnic, robid in malin opazamo stopnjevanje naleta plodove vinske mušice, zato pridelovalcem priporočamo dosledno spremljanjem ulova, še posebno v začetku zorenja plodov.

Mušice ležejo jajčeca v zoreče in že zrele plodove. Izležene ličinke izjedajo plodove, ki se posledično mehčajo in gnijejo. Močan napad je pogost v večjih v nasadih, kjer je veliko propadajočih plodov, zato je pomembno redno odstranjevanje le teh.

Za zatiranje plodove vinske mušice v jagodičju sta registrirani sredstvi **Laser 240 SC** in **Laser plus**. Njuna raba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 16.07.2020 08:32

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

