



81. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št. 10 - 16.07.2020 11:44 - Zaključeno



Vinska trta je sedaj fenološki fazi BBCH 77 do 79 (začetek dotikanja jagod oz. večina jagod se med seboj dotika).

Grozdnici sukači

Ulovi metuljčkov drugega rodu **grozdnih sukačev** na feromonskih vabah so se na večini spremljanih lokacij povečali. Za njihovo zatiranje v tem času priporočamo uporabo pripravka **Vertimec pro** (0,75 L/ha), **Laser plus** (0,2 L/ha), **Radiant** (0,35 L/ha, v rastni sezoni le 1x!!!) in **Steward** (0,0125 %).

Mogoče je še tudi uporabiti enega izmed pripravkov na osnovi *Bacillus thuringiensis*, kot so: **Agree WG** (1 kg/ha) ali **Delfin WG** (0,75 kg/ha) ali **Lepinox plus** (1 kg/ha).

Peronospora vinske trte

Nevarnost okužb s **peronosporo vinske trte** še ni minila. Bolezen se sedaj pojavlja predvsem na zalistnikih in na novo zrastlih listih ter na grozdih. Za naslednja škropeljenja priporočamo uporabo enega izmed kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: **Acrobat MZ WG** (2,5 kg/ha), **Alleato 80 WG** (2,5 kg/ha), **Alleato duo** (4 kg/ha), **Ampexio** (0,5 kg/ha), **Armetil M** (2,5 kg/ha), **Cabrio top** (2 kg/ha), **Curzate M 72,5 WG** (2,3 kg/ha), **Cymbal** (0,25 kg/ha), **Electis 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha), **Emendo F** (1,5 kg/ha), **Enervin** (2,5 kg/ha), **Equation pro** (400 g/ha), **Fortuna gold** (3 kg/ha), **Folpan Gold** (staro ime Ridomil gold combi pepite, 2,5 kg/ha), **Forum MZ WG** (2,5 kg/ha), **Forum star** (1,6 kg/ha), **Fudan gold** (3 kg/ha), **Gett** (2,5 kg/ha), **Mikal Flash** (4 kg/ha), **Mikal premium F** (3 kg/ha), **Momentum F** (4 kg/ha), **Momentum trio** (3kg/ha), **Moximate 725 WG** oz. **WP** (2,5 kg/ha), **Moximate plus** (2,5 kg/ha), **Nautile DG** (2,4 kg/ha), **Orvego** (0,8 L/ha), **Pergado F** (3 kg/ha), **Pergado D** (1,4 L/ha), **Pergado MZ** (2,5 kg/ha), **Reboot** (0,4 kg/ha), **Revus** (0,6 l/ha), **Ridomil gold MZ Pepite** (2,5 kg/ha), **Sanvino** (1,5 kg/ha), **Sfinga Extra WDG** (1,5-2 kg/ha), **Tanos 50 WG** (0,4 kg/ha), **Twingo** (3 kg/ha), **Valis F** (1,5 kg/ha) ali **Valis M** (2 kg/ha). Presledki med škropeljenji pa naj ne bodo daljši kot 8-10 dni.

Uporabiti je mogoče tudi pripravke **LBG-01F34** ali **Soriale LX** v odmerku 4 L/ha (če se uporablja samostojno) ali 3 L/ha (v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi *folpet* ali *mankozeb*) ali **Delan pro** v odmerku 3 L/ha.

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: **Daimyo F** (2,5 L/ha), **Mildicut** (4 L/ha), **Videryo F** (2,5 L/ha) ali **Vincya F** (2,5 L/ha). Pripravkom **Alleato 80 WG**, **Cymbal**, **Equation pro**, **Profiler** in **Revus** priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

Oidij vinske trte

Za preprečitev okužbe z **oidijem vinske trte** priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: **Baltazar** (0,4 L/ha), **Collis SC** (0,4 l/ha), **Custodia** (0,7 L/ha), **Domark 100 EC** (0,3 L/ha), **Dynali** (0,65 l/ha), **Falcon EC 460** (0,4 L/ha), **Folicur EW 250** (0,4 L/ha), **Karathane Gold 350 EC** (0,6 l/ha), **Kusabi 300 SC** (0,3 L/ha), **Mavita 250 EC** (0,2 l/ha), **Misha 20 EW** (0,23 l/ha), **Mystic 250 EC** (0,4 l/ha), **Nativo 75 WG** (0,16 kg/ha), **Orius 25 EW**(0,4 l/ha), **Prosper CS 300** (1 L/ha), **Score 250 EC** (0,2 L/ha), **Sercadis** (0,15 L/ha), **Star Tebukonazol** (0,4 l/ha), **Systhane 20 EW**(0,14 L/ha), **Talendo** (0,25 l/ha), **Talendo extra** (0,2-0,4 l/ha), **Tebusha 25% EW**(0,4 L/ha), **Topas 100 EC** (0,3 l/ha), **Topaze** (0,3 l/ha), **Topsin-M** (1,6 kg/ha), **Unicorn DF** (2,2 kg/ha), **Vitisan** (12 kg/ha) ali

Vivando (0,2 l/ha).

Lahko uporabite tudi pripravka **Cabrio top** (2,0 kg/ha) ali **Universalis** (2 L/ha), ki zaradi kontaktne komponente delujeta tudi proti peronospori vinske trte.

Sredstvom za zatiranje **oidija** lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Cosan** ali **Kumulus DF** ali **Microthiol special** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali **Pol-Sulphur 80 WG oz. WP** (4,0 kg/ha) ali **Symbiotica fito – granulirano žveplo** (4,0 kg/ha) ali **Cosinus** oziroma **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** (8 kg/ha – v primeru pojava oidija). Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava **fitotoksičnosti**.

V primeru pojava **neurij in toče** imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (**Forum star**, **Sfinga extra WDG**, **Pergado F**, **Folpan Gold**, **Mikal flash**, **Mikal premium F** in podobni).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 16.07.2020 11:44

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: Lešnik Leonida

Pripravila: **Leonida Lešnik**

[Seznam registriranih FFS](#)

