

99. POZNE SORTE KROMPIRJA - 21.07.2020 11:09 - Zaključeno



V nasadih poznih sort krompirja, kjer cime še ne nameravate uničiti, je potrebno nadaljevati z varstvom, saj so vremenske razmere še naprej ugodne za razvoj in širjenje krompirjeve plesni. Priporočamo rabo fungicidov z delnim sistemskim delovanjem, kot so pripravki z dimetomorfom (**Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte**), mandipropamidom (**Pergado MZ, Gett, Revus**), cimoksanilom (**Carial flex, Curzate M, Curzate C extra, Equation pro, Moximate, Nautile, Profilux, Reboot, Tanos 50 WG** in drugi) ali valifenalatom (**Valis M**); ali fungicide z dotikalnim delovanjem na osnovi mankozeba (**Avtar, Dithane, Manfil, Pinozeb** in podobni, **Electis 75 WG**), **Polyram DF** ali **bakrove pripravke**.

V nasadih, ki so že močno okuženi s krompirjevo plesnijo, pa priporočamo čimprejšnje uničenje cime, zaradi preprečevanja izpiranja spor v tla in gnitja gomoljev. Po uničenju cime počakajte z izkopom dva do tri tedne, da se v tem času kožica na gomoljih dovolj utrdi, s čimer boste zmanjšali nevarnost okužbe gomoljev ob izkopu in gnitje v skladišču.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila o dovoljenem številu rab posameznih fungicidov!

Datum objave obvestila: 21.07.2020 11:09

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

[Seznam registriranih FFS](#)

