



**88. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.11 - 28.07.2020 08:09 - Zaključeno**



Večina sort vinske trte je trenutno v fenološki fazi BBCH 79-81 (večina jagod se med seboj dotika - začetek zorenja).

Nevarnost okužb s **peronosporo vinske trte** še ni minila. Bolezen se sedaj pojavlja predvsem na zalistnikih in na novo zrastlih listih ter na grozdih. Za naslednja škropljenja priporočamo uporabo enega izmed kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polysistemični + kontaktni) kot so: **Acrobat MZ WG** (2,5 kg/ha), **Ampexio** (0,5 kg/ha), **Armetil M** (2,5 kg/ha), **Curzate M 72,5 WG** (2,3 kg/ha), **Cymbal** (0,25 kg/ha), **Electis 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha), **Emendo F** (1,5 kg/ha), **Enervin** (2,5 kg/ha), **Equation pro** (400 g/ha), **Fortuna gold** (3 kg/ha), **Forum MZ WG** (2,5 kg/ha), **Forum star** (1,6 kg/ha), **Fudan gold** (3 kg/ha), **Gett** (2,5 kg/ha), **Mikal Flash** (4 kg/ha), **Mikal premium F** (3 kg/ha), **Momentum F** (4 kg/ha), **Momentum trio** (3kg/ha), **Orvego** (0,8 L/ha), **Pergado F** (3 kg/ha), **Pergado D** (1,4 L/ha), **Pergado MZ** (2,5 kg/ha), **Reboot** (0,4 kg/ha), **Revus** (0,6 l/ha), **Ridomil gold MZ Pepite** (2,5 kg/ha), **Sanvino** (1,5 kg/ha), **Sfinga Extra WDG** (1,5-2 kg/ha), **Tanos 50 WG** (0,4 kg/ha), **Twingo** (3 kg/ha) ali **Valis F** (1,5 kg/ha). Presledki med škropljenji so lahko dolgi 12-14 dni, v primeru obilnejših padavin pa jih je potrebno skrajšati.

Uporabiti je mogoče tudi kombinirane pripravke z bakrom: **Amaline flow** (2,25 L/ha) ali **Curzate C Extra** (2 kg/ha) ali **Pergado C** (4–5 kg/ha).

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: **Daimyo F** (2,5 L/ha) ali **Mildicut** (4 L/ha) ali **Videryo F** (2,5 L/ha) ali **Vincya F** (2,5 L/ha).

Pripravkom **Cymbal**, **Equation pro** in **Revus** priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

Za preprečitev okužbe z **oidijem vinske trte** priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: **Baltazar** (0,4 L/ha), **Collis SC** (0,4 l/ha), **Custodia** (0,7 L/ha), **Domark 100 EC** (0,3 L/ha), **Dynali** (0,65 l/ha), **Falcon EC 460** (0,4 L/ha), **Folicur EW 250** (0,4 L/ha), **Karathane Gold 350 EC** (0,6 l/ha), **Kusabi 300 SC** (0,3 L/ha), **Mavita 250 EC** (0,2 l/ha), **Misha 20 EW** (0,23 l/ha), **Mystic 250 EC** (0,4 l/ha), **Nativo 75 WG** (0,16 kg/ha), **Orius 25 EW** (0,4 l/ha), **Prosper CS 300** (1 L/ha), **Score 250 EC** (0,2 L/ha), **Sercadis** (0,15 L/ha), **Star Tebukonazol** (0,4 l/ha), **Sythane 20 EW** (0,14 L/ha), **Tebusha 25% EW** (0,4 L/ha), **Topas 100 EC** (0,3 l/ha), **Topaze** (0,3 l/ha), **Unicorn DF** (2,2 kg/ha) ali **Vitisan** (12 kg/ha).

Lahko uporabite tudi pripravek **Universalis** (2 L/ha), ki zaradi kontaktne komponente deluje tudi proti peronospori vinske trte.

Sredstvom za zatiranje **oidija** lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Cosan** ali **Kumulud DF** ali **Microthiol special** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0-8,0 kg/ha. **Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti.**

V primeru pojava **neurij in toče** imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (**Forum star**, **Sfinga extra WDG**, **Pergado F in podobni**). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so **Protifert LMW**, **Algoplasmin ali podobnih**. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

**Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.**

**V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.**

