



## 102. VARSTVO PLODOVK PRED ŠKODLJIVCI - 04.08.2020 12:56 - Zaključeno



Na papriki se pojavljajo listne uši, predvsem siva breskova uš, ki je tudi prenašalka rastlinskih virusov, kot sta virus mozaika kumare (CMV) in virus Y krompirja (PVY). Poleg tega lahko uši z izsesavanjem rastlinskega soka poslabšajo rast rastlin, zato bodite pozorni na morebiten povečan nalet škodljivca in tudi na prisotnost koristnih žuželk v nasadu (ličink polonic, trepetavk, tenčičaric itd.), ki uničujejo listne uši. Ob prerezamnožitvi lahko v zavarovanih prostorih uporabite sredstva s krajšo karenčno dobo (do 3 dni), kot so **Biotip floral**, **Calypso SC 48Q Closer**, **Confidor 70 WG**, **Neemazal – T/S**, **Sivanto prime**, **Teppeki**, pri uporabi sredstev **Kohinor SL 200** in **Pirimor 50 WG** pa znaša karenčna doba za papriko 7 dni. Na prostem je proti škodljivcu dovoljena tudi uporaba sredstev **Karate Zeon 5 CS** (karenca 3 dni) in **Mospilan 20 SG** (karenca 7 dni).

Na jajčevcih se ponekod pojavlja koloradski hrošč, zato spremljajte njegov razvoj. Na prostem lahko za zatiranje ličink hrošča uporabite katerega od pripravkov: **Karate Zeon 5 CS** ali **Neemazal – T/S**. Visoke temperature v preteklem tednu so ugodno vplivale tudi na razvoj listnih zavrtalk iz rodu *Liriomyza*, ki se rade pojavijo v zavarovanih prostorih, predvsem na paradižniku. Da je škodljivka napadla rastlino lahko sklepamo po značilnih rovih na listih paradižnika, ki jih z izjedanjem povzročajo ličinke. Ob pojavu prvih ličink lahko uporabite sredstvi **Neemazal –T/S** ali **Vertimec pro**.

**Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte opozorila za varstvo čebel in okolja!**

Datum objave obvestila: 04.08.2020 12:56

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta in MAROLT Neja

Pripravili: **Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt**

Seznam registriranih FFS

