



Severovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor / Lupinarji
/ 96. OBVESTILO O VARSTVU OREHOV (orehova muha)

96. OBVESTILO O VARSTVU OREHOV (orehova muha) - 28.08.2020 10:07 - Zaključeno



Pridelovalce orehov obveščamo, da so ulovi orehove muhe v spremljanih nasadih orehov v drugi polovici meseca avgusta še vedno konstantni zato priporočamo, da vsaj enkrat na teden redno kontrolirate ulove na rumenih ploščah ter količino atraktanta v vrečki.

V nasadih, kjer je od zadnjega škropljenja orehove muhe minilo 12 do 14 dni in se na rumene lepljive plošče še vedno lovi orehova muha, priporočamo ponovno škropljenje z enim izmed spodaj navedenih insekticidov (**upoštevati je potrebno**

število dovoljenih uporab posameznega pripravka v eni rastni sezoni ter karence !!!).

Za zatiranje je mogoče uporabiti **Laser 240 SC** (karenca: 30 dni) v odmerku 0,15 l/ha ali **Laser plus** (karenca: 30 dni) v odmerku 0,075 l/ha pri porabi vode **do** 3 L na drevo v polni rodnosti. Škropilni brozgi je potrebno dodati atraktant npr. **NutreI** (beljakovinska vaba za muhe) v 1,5% koncentraciji (1,5 L/100 L vode). **Tretira se le eno tretjino drevesne krošnje** (spodnji del krošnje na severni ali vzhodni strani), za škropljenje pa se naj uporabijo šobe, ki oblikujejo nekoliko večje kapljice.

Prapravek **Laser 240 SC** ali **Laser Plus** se lahko na istem zemljišču oba skupaj uporabita največ tri krat v eni rastni sezoni !!!

Namesto pripravka Laser ali Laser Plus je mogoče uporabiti tudi pripravek **Calypso SC 480** (0,25 L/ha, največ 2x v eni rastni sezoni !!!, karenca:14 dni) ali **Imidan 50 WG** (1,5 kg/ha, največ 2x v eni rastni sezoni !!!, karenca:7 dni). Obema pripravkoma se priporoča dodajanje atraktanta npr. **NutreI**. Poškropi se prav tako le spodnja tretjina krošnje drevesa. V tem primeru je mogoče zmanjšati odmerek zgoraj omenjenih pripravkov na eno tretjino od navedenega. (Calypso SC 480 0,08 L/ha – 80 ml/ha, Imidan 50 WG 0,5 kg/ha).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 28.08.2020 10:07

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MATKO Boštjan

Pripravil: **Boštjan Matko**

[Seznam registriranih FFS](#)

