



3. VARSTVO KOŠČIČASTIH SADNIH VRST - 05.03.2021 15:49 - Zaključeno



Trenutno pomladno prebujanje sadnega drevja poteka pod vplivom dnevno nočnih temperaturnih nihanj. Hitrejša napredovanje v brstenju bo steklo ob ponovnem dvigu nočnih temperatur. Breskev razpira brste in na najtoplejših legah ima že opazne svetlo zelene dele brsta (53 po lestvici BBCH).

Pridelovalcem breskev in nektarin svetujemo, da opravite prvo varstvo pred **breskovo kodravostjo** še pred pojavom padavin. Dokler zeleni deli še niso izpostavljeni, priporočamo rabo bakrovih pripravkov, ki imajo učinek tudi proti drugim glivičnim in bakterijskim boleznim. Ob tem opozarjamo na pazljivost, saj se pri nizkih temperaturah in padavinah pojavijo ožigi. Upoštevajte priporočene odmerke. V poštev pridejo: **CUPRABLAU Z 35 WP** (3,0 kg/ha proti breskovi kodravosti in 2,0 kg proti listni luknjičavosti koščičarjev), **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,6 – 2,0 kg/ha; proti listni luknjičavosti), **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (1,8 kg/ha; le breskova kodravost), **BADGE WG** (3,5 kg/ha; le listna luknjičavost), **NORDOX 75 WG** (2 kg/ha). Kjer so konice lističev že toliko razvite, da bi jih baker poškodoval, uporabite **SYLLIT 400 SC** (2,25 l (ha/ha) ali **SYLLITE 544 SC** (1,65 l/ha).

V času cvetenja marelic (10% odprtih cvetov), boste opravili varstvo proti **cvetni moniliji** z enim od pripravkov: **AMYLO-X** (1,5 – 2,5 kg/ha), **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (15 ml/5 l vode, oz. največ 3,3 l/ha), **MAMTA 250 EC** (0,45 l/ha), **PROLECTUS** (1 kg/ha), **SCORE 250 EC** (0,45 l/ha), **SWITCH 62,5 WG** (1 kg/ha), **SIGNUM** (0,75 kg/ha), **SERENADE ASO** (8 l/ha), **TOPSIN-M** (1 kg/ha) ali **ZENBY** (0,9 l/ha). Nanos priporočamo v večernem času, ko se ozračje umiri in ne letajo čebele.

V nasadih češenj, višenj in sliv se brsti zelo intenzivno napenjajo. Priporočamo zaščito pred **listno luknjičavostjo koščičarjev** s pripravki kot so: **BADGE WG** (3,5 kg/ha; tudi proti *češpljevi metličavosti*, oz. *rožičavosti češpelj*), **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,6 – 2 kg/ha; tudi proti *češnjevi listni pegavosti* in raznim *ožigom*), **CUPRABLAU Z 35 WP** (2 kg/ha), **CHAMPION 50 WG** (2 – 3 kg/ha; tudi proti raznim *ožigom* in *češpljevi metličavosti*, oz. *rožičavosti češpelj*).

Pregrevanje debel in izpostavljanje pozebi ter glivičnim okužbam lahko oslabite z **beljenjem debel z apnenim beležem**, oz. **kaolinskimi glinami**, ki bodo z odbojem močnejših sončnih žarkov brstenje upočasnili.

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele (navedena sredstva sicer niso nevarna za čebele). Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 05.03.2021 15:49

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

