



## 6. VARSTVO KOŠČIČASTIH SADNIH VRST - 10.03.2021 10:41 - Zaključeno



Breskev razpira brste, luske so razprte in ima opazne svetlo zelene dele brsta (53 po lestvici BBCH). Marelice so v polnem cvetenju (65 po lestvici BBCH). Češnje nabrekajo cvetne brste, ki so še zaprti in imajo cvetlo rjave luske (51-53 po lestvici BBCH)

Pridelovalcem svetujemo, da v nasadih breskev za varstvo pred **breskovo kodravostjo** opravite nanos fungicida pred padavinami. Priporočamo pripravek **SYLLIT 400 SC** (2,25 l (ha/ha), oz. **SYLLIT 544 SC** (1,65 l/ha).

V nasadih marelic svetujemo ob napovedanih padavinah, ob zaključevanju cvetenja, še drugo tretiranje proti **cvetni moniliji**. Uporabite lahko: **AMYLO-X** (1,5 – 2,5 kg/ha), **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (15 ml/5 l vode, oz. največ 3,3 l/ha), **MAMTA 250 EC** (0,45 l/ha), **PROLECTUS** (1 kg/ha), **SCORE 250 EC** (0,45 l/ha), **SWTCH 62,5 WG** (1 kg/ha), **SIGNUM** (0,75 kg/ha), **SERENADE ASO** (8 l/ha), **TOPSIN-M** (1 kg/ha) ali **ZENBY** (0,9 l/ha). Nanos priporočamo v večernem času, ko se ozračje umiri in ne letajo čebele.

V nasadih češenj, višenj in sliv priporočamo zaščito pred **listno luknjičavostjo koščičarjev** s pripravki kot so: **BADGE WG** (3,5 kg/ha; tudi proti češpljevi metličavosti, oz. rožičavosti češpelj), **CUPRABLAU Z 35 WG** (1,6 – 2 kg/ha; tudi proti češnjevi listni pegavosti in raznim ožigom), **CUPRABLAU Z 35 WP** (2 kg/ha), **CHAMPION 50 WG** (2 – 3 kg/ha; tudi proti raznim ožigom in češpljevi metličavosti, oz. rožičavosti češpelj).

**Pregrevanje debel** in izpostavljanje pozebi ter glivičnim okužbam lahko oslabite z **beljenjem debel z apnenim beležem**, oz. **kaolinskimi glinami**, ki bodo z odbojem močnejših sončnih žarkov brstenje upočasnili.

Pri pridelavi koščičastega sadja bodite v nasadih pozorni na nalet **vrtnih zavrtačev**, hroščkov iz skupine podlubnikov. Hroščki z zavrtanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo številčnost lahko zmanjšujete s pomočjo **alkoholnih pastí** (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola).

**Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele (navedena sredstva sicer niso nevarna za čebele). Pri uporabi fitofarmaceutskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.**

Datum objave obvestila: 10.03.2021 10:41

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

