



7. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 16.03.2021 12:38 - Zaključeno



VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN

Hladno vreme je nekoliko upočasnilo razvoj sadnih vrst. Breskve in nektarine so na območju Celjske regije v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi D (BBCH 55- 56) in na izpostavljenih lokacijah prehajajo v fenološko fazo BBCH 57. **Nevarnost za okužbe z breskovo kodravostjo še ni minila.**

Na območju Celjske in Koroške regije je v času med 12. in 14. marcem na opazovanih sadjarskih lokacijah padlo od 20 do 26 mm dežja, kar je povzročilo spiranje fungicidne obloge. Zato v primeru napovedi padavin, pred padavinami ponovite škropljenje proti breskovi kodravosti s pripravkom **Syllit 400 SC** (2,25 L/ha).

breskve in nektarine so času cvetenja občutljive za okužbe s **cvetno monilijo**. Ugodne pogoje za širjenje okužb v večjem obsegu ustvarja deževno in hladno vreme.

Spremljanje fenološki razvoj breskev in nektarin ter vremenske razmere. V primeru padavin, v fenološki fazi začetka cvetenja (ko je odprtih več kot 10 % cvetov), opravite škropljenje proti cveteni moniliji. Uporabite enega od pripravkov, ki so navedeni v preglednici. Pripravek Amylo –X je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

FFS	Odmerek (koncentracija)
Amylo –X	1,5 – 2,5 kg/ha
Chorus 50 WG	0,5 kg/ha
Luna experience	0,6 L/ha (0,2 L na 1 m višine krošnje/ha)
Switch 62,5 WG	1 kg/ha (0,08%)
Prolectus	1kg/ha (330 g na 1 m višine krošnje/ha)
Signum	0,75 kg/ha (0,25 kg na 1 m višine krošnje/ha)
Zenby	0,9 L/ha

V primeru deževnega in hladnejšega vremena v času polnega cvetenja breskev in nektarin je potrebno škropljenje ob koncu cvetenja ponoviti.

Datum objave obvestila: 16.03.2021 12:38

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

