



12. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.4 - 25.03.2021 09:48 - Zaključeno



Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo BBCH 54 (stadij mišjega ušesca) do 55 (vidni še zaprti cvetni popki), na nekaterih lokacijah in sortah pa so jablane šele dosegle fenološko fazo BBCH 53 - 54 (odpiranje brsta – stadij mišjega ušesca).

Ob zadnjih padavinah smo v Mariboru na lovilcu spor zabeležili izbruhe askospor **jablanovega škrlupa**. Število izbruhanih askospor je bilo majhno. Zaradi nizkih temperatur v času padavin pogoji za primarno okužbo niso bili izpolnjeni. Pričakujemo, da bodo v času naslednjih obilnejših padavin izbruhi askospor občutno močnejši. V primeru vremenske napovedi s padavinami in višjimi temperaturami je zato potrebno jablane in hruške poškropiti **še pred napovedanim dežjem**.

Do prvih primarnih okužb pa lahko pride le v primeru, če bo zaradi padavin listje in že odprti brsti mokri daljši čas (pri povprečni temperaturi 8°C - 20 ur) in to predvsem v nasadih, kjer lanskoletno listje iz nasada ni bilo odstranjeno – pometeno.

Za škropljenje proti **jablanovemu in hruševemu škrlupu** lahko uporabite enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) mankozeb (**Avtar 75 NT, Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45**) in a.s. metiram (**Polyram DF**) ali pripravka na osnovi bakra; **Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (2,5 kg/ha)** ali **Kocide 2000 (2 kg/ha)**.

Namesto naštetih pripravkov lahko uporabite tudi pripravek **Curatio - žveplena apnena brozga**, ki je dne 19.2.2021 dobil dovoljenje za nujne primere za obdobje 120 dni in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

Za zatiranje kaparjev, jajčec rdeče sadne pršice in jajčec listnih uši, ki prezimijo na lesu, priporočamo uporabo parafinskega olja **Frutapon** (v odmerku 10 L/ha na meter višine krošnje, najvišji dovoljeni odmerek je 30 L/ha) ali **Ovitex** (20 L/ha) ali olja oljne ogrščice **Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat v 3 % koncentraciji**. Učinkovitost delovanja olj je boljša v oblačnem vremenu in ob višji relativni zračni vlagi. Po podatkih iz tujine večjo učinkovitost delovanja olj dosežemo z 'dvojno aplikacijo' iste vrste v nasprotnih smereh vožnje (v tem primeru se za posamezno smer vožnje uporabi polovični odmerek).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 25.03.2021 09:48

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

Seznam registriranih FFS

