

16. VARSTVO KOŠČIČASTIH SADNIH VRST - 26.03.2021 14:58 - Zaključeno



Breskev prehaja v cvetenje (57 – 59 po lestvici BBCH).

Pridelovalcem svetujemo, da pred naslednjimi padavinami opravite zaščito pred **breskovo kodravostjo** s pripravkom **SYLLIT 400 SC** (2,25 l (ha/ha), oz. **SYLLIT 544 SC** (1,65 l/ha).

Ko bodo nasadi začeli cveteti (odprtih 10 % cvetov), bodite pozorni na **cvetno monilijo**. Takrat pridejo v poštev pripravki: **AMYLO-X** (1,5 – 2,5 kg/ha), **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha), **LUNA EXPERIENCE** (0,6 l/ha), **MAMTA 250 EC** (0,45 l/ha), **PROLECTUS** (1 kg/ha), **SCORE 250 EC** (0,45 l/ha), **SIGNUM** (0,75 kg/ha), **SWTCH 62,5 WG** (1 kg/ha), **TELDOR SC 500** (1 l/ha) ali **ZENBY** (0,9 l/ha)

Marellice zaključujejo cvetenje (68-69 po lestvici BBCH).

Ob nestanovitnem vremenu je potrebno opraviti še drugi nanos fungicida proti **cvetni moniliji**. Uporabite lahko: **AMYLO-X** (1,5 – 2,5 kg/ha), **CHORUS 50 WG** (0,5 kg/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (15 ml/5 l vode, oz. največ 3,3 l/ha), **MAMTA 250 EC** (0,45 l/ha), **PROLECTUS** (1 kg/ha), **SCORE 250 EC** (0,45 l/ha), **SWTCH 62,5 WG** (1 kg/ha), **SIGNUM** (0,75 kg/ha), **SERENADE ASO** (8 l/ha), **TOPSIN-M** (1 kg/ha) ali **ZENBY** (0,9 l/ha).

Češnje in višnje imajo opazno razvite cvetne nastavke in se bližajo cvetenju (55 – 57 po lestvici BBCH).

Ob začetku cvetenja je zlasti v primeru padavin priporočljivo opraviti varstvo pred **cvetno monilijo**. V poštev pridejo: **LUNA EXPERIENCE** (0,2 l/ha na višino metra krošnje; največ 0,6 l/ha), **PROLECTUS** (330 g/ha na višino metra krošnje; največ 1 kg/ha), **SIGNUM** (0,25 kg/ha na višino metra krošnje; največ 0,75 kg/ha), **SWTCH 62,5 WG** (0,08 % konc., največ 1 kg/ha), **TELDOR SC 500** (največji odmerek 1,5 l/ha, 0,5 l/ha na meter višine krošnje), **TOPSIN – M** (1 kg/ha), **DUAXO KONCENTRAT** (1,1 l/ha na meter višine krošnje, oz. največ 3,3 l/ha; za češnje in višnje), **ZENBY** (0,9 l/ha), **AMYLO-X** (1,5 – 2,5 kg/ha) in **SERENADE ASO** (8 l/ha). Slednja sta primerna tudi za ekološko pridelavo.

Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 26.03.2021 14:58

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

