



11. VARSTVO ČEŠENJ IN VIŠENJ - 30.03.2021 11:03 - Zaključeno



Na izpostavljenih legah Celjske regije zgodnje sorte češenj na šibkih podlagah prehajajo s fenološke faze belega popka BBCH 57 v fazo stadija balona BBCH 59. Pozne sorte češenj in višenj so še v fenološki fazi zelenega popka BBCH 55-56. Na območju Koroške razvoj zaostaja, češnje in višnje so v fazi odpiranja brsta. Toplo vreme z napovedanimi visokimi temperaturami zraka bo pospešilo razvoj. Zato spremljajte razvoj cvetnih brstov.

Svetujemo, da opravite prvo škropljenje proti **cvetni moniliji**, ko bo odprtih 10 % cvetov. V primeru deževnega vremena v času cvetenja, opravite še eno oz. drugo škropljenje v času, ko začnejo odpadati prvi venčni listi.

Škropljenje češenj in višenj opravite z enim od pripravkov kot so: **Luna experience** (0,2 L/ha na 1 m višine krošnje, do največ 0,6 L/ha), **Signum** (0,25 kg/ha na 1m višine krošnje, do največ 0,75 L/ha) ali **Duaxo koncentrat** (1,1 L/ha na 1m višine krošnje, do največ 3,3 L/ha) ali **Zenby** (0.9 L/ha) Uporabite lahko tudi pripravek na osnovi antagonističnega delovanja bakterije *Bacillus amyloliquefaciens* **Amilo-X** (1,5 - 2,5 kg/ha), ki ima dovoljenje za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Samo za češnje pa lahko proti cvetni moniliji uporabite tudi pripravke kot so: **Switch 62,5 WG** (0,08 % konc., najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha), **Teldor SC 500** (0,5 L/ha na 1 m višine krošnje, najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1,5 L/ha), **Prolectus** (330 g/ha na 1 m višine, najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha) ali **Topsin M** (1kg/ha – zaloge v prodaji do 30.4.2021, zaloge v uporabi do 19.10.2021).

Uporabite lahko tudi pripravek na osnovi antagonističnega delovanja bakterije *Bacillus subtilis* **Serenade ASO** (8 L/ha), ki ima prav tako dovoljenje za uporabo v ekološki pridelavi.

Opozorilo: Zaradi zaščite čebel in drugih opravevalcev se med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti ne sme tretirati s sredstvi, ki so nevarna oz. strupena za čebele. Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele pred njihovo uporabo še posebej pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarne za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

Datum objave obvestila: 30.03.2021 11:03

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

Seznam registriranih FFS

