



12. VARSTVO SLIV IN ČEŠPELJ - 30.03.2021 11:05 - Zaključeno



Na območju Celjske regije so slive in češplje glede na sorte in lege v povprečju v fenološki fazi BBCH 56 - 57. Na območju Koroške razvoj zaostaja, slive in češplje so v fazi odpiranja brsta. Toplo vreme z napovedanimi visokimi temperaturami zraka bo pospešilo razvoj. Zato spremljajte razvoj cvetnih brstov.

Svetujemo, da opravite prvo škropljenje proti **cvetni moniliji**, ko bo odprtih 10 % cvetov. V primeru deževnega vremena v času cvetenja, opravite še eno oz. drugo škropljenje v času, ko začnejo odpadati prvi venčni listi.

Uporabite lahko enega od pripravkov kot so: **Chorus 50 WG** (0,5 kg/ha), **Luna experience** (0,2 L/ha na 1 m višine krošnje, do največ 0,6 L/ha), **Signum** (0,25 kg/ha na 1 m višine krošnje, do največ 0,75 L/ha), **Prolectus** (330 g/ha na 1 m višine, najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha), **Switch 62,5 WG** (0,08 % konc., najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha), **Zenby** (0,9 L/ha) ali **Topsin M** (1 kg/ha – zaloge v prodaji do 30.4.2021, zaloge v uporabi do 19.10.2021).

Uporabite lahko tudi pripravka na osnovi antagonističnega delovanja bakterije *Bacillus subtilis* **Serenade ASO** (8 L/ha) ali *Bacillus amyloliquefaciens* **Amilo -X** (1,5 - 2,5 kg/ha), ki imata dovoljenje tudi za uporabo v ekološki pridelavi.

Svetujemo, da za spremljanje pojava **rumene ali črne češpljeve grizlice**, **izobesite bele lepljive plošče**. Samo v primeru, da boste na bele lepljive plošče ulovili skupaj več kot 30 osic **rumene ali črne češpljeve grizlice**, **po končanem cvetenju** opravite škropljenje proti omenjeni škodljivki s pripravkom **Mospilan 20 SG**, v 0,04 % konc.

Opozorilo: **Zaradi zaščite čebel in drugih oprasevalcev se med cvetenjem gojenih rastlin in podrast ne sme tretirati s sredstvi, ki so nevarna oz. strupena za čebele. Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele pred njihovo uporabo še posebej pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarna za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.**

Datum objave obvestila: 30.03.2021 11:05

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

[Seznam registriranih FFS](#)

