



16. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.5 - 31.03.2021 09:02 - Zaključeno



Razvoj sadnega drevja je v zadnjem tednu zaradi višjih temperatur hitro napredoval. Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo zeleni popek - rožnati popek (BBCH 56-57) po BBCH skali.

Ob zadnjih padavinah smo v Mariboru zabeležili nekoliko večji izbruh askospor **jablanovega škrlupa**, vendar zaradi nizkih temperatur v času padavin okužba ni bila mogoča. Ob naslednjih padavinah lahko pričakujemo, da bodo izbruhi askospor še močnejši, zato priporočamo, da škropljenje opravite **še pred napovedanimi padavinami**.

Za škropljenje proti **jablanovemu škrlupu**, priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) mankozeb (**Avtar 75 NT, Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45**), a.s. metiram (**Polyram DF**), ali pripravkov na osnovi ditianona (**Delan PRO, Alcoban**) ali dodina (**Syllit 400 SC**). Sredstva Syllit se ne sme mešati z močljivimi žvepli, bordojsko brozgo, s sredstvi, ki vsebujejo aktivne snovi kaptan, fenoksikarb, cink ali baker, apno, s sredstvi alkalne pH reakcije ter foliarnimi gnojili na osnovi morskih alg, cinka ali bakra. O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom.

Namesto naštetih pripravkov lahko uporabite tudi pripravek **Curatio - žveplena apnena brozga**, ki je dne 19.2.2021 dobil dovoljenje za nujne primere za obdobje 120 dni in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

V tistih nasadih, kjer prevladujejo sorte, ki so občutljive na **jablanovo pepelovko** ('Idared', 'Jonagold'...), priporočamo pri temperaturi nad 15°C dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Azumo WG, Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Microthiol disperss, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Vertipin, Biotip Sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC oz. Symbiotica Fito – tekoče žveplo** v priporočenih odmerkih.

Za zatiranje kaparjev, jajčec rdeče sadne pršice in jajčec listnih uši, ki prezimijo na lesu, priporočamo uporabo parafinskega olja **Frutapon** (v odmerku 10 L/ha na meter višine krošnje, najvišji dovoljeni odmerek je 30 L/ha) ali **Ovitex** (20 L/ha) ali olja oljne ogrščice **Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat v 3 % koncentraciji**. Učinkovitost delovanja olj je boljša v oblačnem vremenu in ob višji relativni zračni vlagi. Po podatkih iz tujine večjo učinkovitost delovanja olj dosežemo z 'dvojno aplikacijo' iste vrste v nasprotnih smereh vožnje (v tem primeru se za posamezno smer vožnje uporabi polovični odmerek).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 31.03.2021 09:02

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

Seznam registriranih FFS

