



23. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.7 - 12.04.2021 07:43 - Zaključeno



Razvoj jablan in hrušk je v zadnjem tednu na najbolj ugodnih legah že dosegel fenološko fazo: socvetja v balonskem stadiju – odprti prvi cvetovi (59 - 60 po BBCH skali).

Ob zadnjih padavinah smo v Mariboru zabeležili nekoliko večji izbruh askospor **jablanovega škrlupa**, vendar zaradi nizkih temperatur v času padavin okužba ni bila mogoča. Pričakujemo, da bodo v času naslednjih obilnejših padavin izbruhi askospor občutno močnejši. V primeru vremenske napovedi s padavinami je zato potrebno jabolane in hruške poškopiti **še pred napovedanim dežjem**.

Za škropljenje proti jablanovemu in hruševemu škrlupu priporočamo predvsem uporabo pripravka na osnovi aktivne snovi dodin (**Syllit 400 SC**). Lahko uporabite tudi enega od ostalih kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) mankozeb (**Avtar 75 NT, Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45**), a.s. metiram (**Polyram DF**), ali pripravkov na osnovi ditianona (**Delan PRO, Alcoban**). Sredstva **Syllit** se ne sme mešati z močljivimi žvepli, bordojsko brozgo, s sredstvi, ki vsebujejo aktivne snovi kaptan, fenoksikarb, cink ali baker, apno, s sredstvi alkalne pH reakcije ter foliarnimi gnojili na osnovi morskih alg, cinka ali bakra. O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom. V nasadih, kjer so jabolane že začele cveteti, ne smemo uporabiti pripravka **Syllit 400 SC**.

V primeru napovedi dolgotrajnih padavin je mogoče uporabiti tudi anilinopirimidinske pripravke (**Chorus 50 WG, Faban, Mythos, Pyrus 400 SC, Scala, Batalion 450 SC**), ki imajo prednost pred kontaktnimi fungicidi. Anilinopirimidinskim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravku Faban.

Namesto naštetih pripravkov lahko uporabite tudi pripravek **Curatio - žveplena apnena brozga**, ki je dne 19.2.2021 dobil dovoljenje za nujne primere za obdobje 120 dni in je dovoljen tudi v ekološki pridelavi.

V tistih nasadih, kjer prevladujejo sorte, ki so občutljive na **jablanovo pepelovko** ('Idared', 'Jonagold'...), priporočamo pri temperaturi **nad 15°C** dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Azumo WG, Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Microthiol disperss, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Vertipin, Biotip Sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC** oz. **Symbiotica Fito – tekoče žveplo** v priporočenih odmerkih. V nasadih, kjer so jabolane že začele cveteti, je najvišji dovoljen odmerek za žvepla 3 kg/ha oz. 3 L/ha.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 12.04.2021 07:43

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

