

23. VARSTVO VINSKE TRTE - 15.04.2021 15:40 - Zaključeno



Vinska trta pričenja z brstenjem. Glede na izpostavljenost sončnim žarkom in sortiment, lahko zasledimo nabrekanje brsta in pokanje lusk, do brstov v stadiju volne in na zgornjih legah celo opazne konice zelenih poganjkov (03-07 po lestvici BBCH).

Topli dnevi s temperaturami nad 15°C omogočajo uporabo žveplovih pripravkov: **THIOVT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, VINDEK 80 WG**, ki v odmerku 3 do 8 kg/ha zmanjšajo stopnjo napada **pršic trsne kodravosti (akarinoze), trsne pršice (erinoze)**, učinkujejo na zmanjševanje okužb **črne pegavosti vinske trte** in delujejo proti **oidiji vinske trte**. Proti navedenim škodljivim organizmom pride na stopnji še zaprtih brstov v poštev tudi pripravek **RED FOX** (kombinacija parafinskega olja in bakrovega oksida; odmerek 15 l/ha), ki je predviden za varstvo pred **rdečo sadno pršico** ali **gabrovo pršico** in zmanjšuje še **črno pegavost vinske trte** (v odmerku 25 – 30 l/ha).

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 15.04.2021 15:40

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

