



24. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.1 - 16.04.2021 13:09 - Zaključeno



Vinska trta je na najtoplejših legah dosegla fenološko fazo B do C oziroma 3 do 5 po skali BBCH. To fenološko fazo so dosegle najbolj hitro razvijajoče se sorte kot so 'Chardonnay', 'Rumeni muškat' in 'Ranina'. Ostale sorte npr. 'Laški rizling' so šele v fenološki fazi nabrekanja brstov BBCH 02.

V vinogradih, kjer se je v lanskem letu v poletju močneje pojavila akarinoza vinske trte na zgornjih listih zelenih mladice, lahko tudi letos pričakujemo pojav trsne kodravosti ali akarinoze, kakor tudi trsne pršice šiškarice – erinoze. Večji napad lahko pričakujemo, če bo vreme hladno v obdobju brstenja, zaradi počasne rasti vinske trte.

V teh vinogradih priporočamo za zmanjšanje populacije pršice trsne kodravosti (*Calepitrimerus vitis*) in trsne pršice šiškarice (*Colomerus vitis*) v fenološki fazi (BBCH 05-08) od stadija volne do konca brstenja – vidne konice zelenih poganjkov, uporabo pripravkov na osnovi žvepla kot so: **Cosan** ali **Kumuluf DF** ali **Microthiol special** ali **Microthiol disperss** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0 - 8,0 kg/ha. Uporaba žvepla v visokem odmerku v kasnejši fenološki fazi ima po priporočilih iz tujine negativen vpliv na koristne vrste pršic. Za učinkovito delovanje omenjenih pripravkov je potrebna dovolj visoka dnevna temperatura zraka (**nad 15°C optimalno nad 18°C**) v času tretiranja. Po škropljenju naj bo vreme nekaj dni stabilno brez padavin. Z omenjenimi pripravki zmanjšamo tudi okužbe s črno pegavostjo in oidijem.

Trsno kodravost ali **akarinozo** in **erinozo** lahko zatiramo tudi kasneje v fenološki fazi D – E, to je v času, ko so mladice dolge 2 do 5 cm (BBCH 12- 14) s pripravkom **Vertimec pro** v 0,1% konc. največ 1,0 l/ha.

V vinogradih, kjer je bilo v preteklih letih opaziti pojav GPGV virusa (simptomi podobni, kot je napad akarinoze vinske trte), ta ukrep še posebej priporočamo, saj je bila trsna pršica šiškarica (*Colomerus vitis*) tudi v Sloveniji dokazana kot prenašalka tega virusa. Pojav omenjenega virusa opazimo predvsem na sortah: 'Modri pinot', 'Sivi pinot' in 'Traminec'.

V vinogradih, kjer se je v preteklem letu prereznožila **rdeča sadna pršica** (*Panonychus ulmi*) ali **gabrova pršica** (*Eotetranychus carpini*), priporočamo v fenološki fazi brsti nabrekli vendar še ne zeleni (BBCH 03) uporabo pripravka **Red fox** v odmerku 15 L/ha. Omenjeni pripravek v odmerku 25 do 30 L/ha zmanjšuje okužbe s **črno pegavostjo vinske trte** (*Phomopsis viticola*).

Za učinkovito delovanje priporočenih pripravkov je potrebno zagotoviti dovolj dobro omočenost rozg in glave trte. Škropljenje naj bo obojestransko, z majhno količino zračnega toka skozi ventilator pršilnika ob porabi vode 300 do 500 L/ha.

V času brstenja vinske trte je možen pojav **zemljemerke** in **škodljivih vrst sovok**, ki povzročajo izjedanje brstov. Priporočamo redne preglede vinogradov, še posebej tistih, kjer se je škoda pojavljala v preteklih letih. Preglede izvajamo v nočnem času med 22:00 - 01:00 uro, ko so gosenice najbolj aktivne. Na manjših površinah ali v vinogradih ob gozdnem robu ob pojavu prvih poškodb brstov priporočamo **ročno odstranjevanje gosenic**, ki močno zmanjša njihovo številčnost. Omenjen ukrep se mora ob množičnem pojavu gosenic izvajati vsak dan.

Prve metuljčke **grozdnih sukačev** smo na področju SV Slovenije na feromonske vabe ujeli 10. aprila. Priporočamo, da se izobesijo feromonske vabe za spremljanje križastega in pasastega grozdnega sukača, še posebej za tiste vinogradnike, ki so vključeni v KOPOP ukrep »VIN-VABE«.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 16.04.2021 13:09

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

Seznam registriranih FFS

