

28. VARSTVO VINSKE TRTE - 30.04.2021 14:28 - Zaključeno



Vinska trta ima brste v stadiju volne, oz. že jasno vidne konice zelenih listov (07-08 po lestvici BBCH). V prihajajočih toplih dneh bo razvoj mladice še intenzivnejši.

Ta čas, ko se ozračje segreva, je smiselno preventivno nanesti žveplove pripravke (pri temperaturah nad 15° C): **THIOVT JET**, **COSAN**, **KUMULUS DF**, **MICROTHIOL SPECIAL**, **MICROTHIOL DISPERS**, **PEPELIN WG** ali **VINDEX 80 WG**. Navedeni pripravki v odmerku 3 do 8 kg/ha zmanjšajo stopnjo napada **pršic trsne kodravosti** (*akarinoze*), **trsne pršice** (*erinoze*), učinkujejo na zmanjševanje okužb **črne pegavosti vinske trte** in delujejo proti **oidiji vinske trte**.

Zatiranje fitofagnih pršic je pomembno tudi iz vidika preprečevanja širjenja virusnih obolenj, kot je npr. **Grapevine Pinot gris virus** (**GPGV**).

V deževnih dneh je nevarnost okužb s **črno pegavostjo vinske trte** velika in je še pred padavinami potrebno uporabiti pripravke kot so: **CUPRABLAU Z 35 WG** (3 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WP** (3 kg/ha), **CUPRABLAU Z ULTRA WP** (1,8 kg/ha), oz. **FOLLOW 80 WG** (1,9 kg/ha), **FOLPAN 80 WDG** (1,9 kg/ha), **POLYRAM DF** (največji odmerek 3 kg/ha). Predvidena sta dva nanosa; prvič, ko so mladice velike ~ 2 cm in drugič 7 do 10 dni kasneje.

Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 30.04.2021 14:28

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

