

25. OBVESTILO O VARSTVU FIŽOLA PRED PLEVELI - 06.05.2021 11:39 - Zaključeno



Pridelovalci fižola so v teh dneh pričeli s setvijo, zgodnejši posevki so v zgodnjih fazah kalitve. Navajamo seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v posevkih fižola.

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2021, za uporabo v posevkih fižola

po setvi pred vznikom fižola in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe fižol BBCH	Karenca in opombe
BOXER O. in Š. pl.	prosulfokarb	EC	5,0 L/ha	Preem	ČU, zagotovljena mora biti dobra pokritost semena (globina setve najmanj 8 cm).
FRESCO E. Š. in O. pl.	metobromuron	SC	2,0 L/ha	Preem	ČU, samo v fižolu za stročje in sveže zrnje. Uporaba za pridelavo fižola za suho zrnje ni dovoljena!
CHALLENGE** Š. in O. pl.	aklonifen	SC	4,0 L/ha	Preem, pred vznikom BBCH 00-08	90 dni, za dobro delovanje je pomembna vlaga v tleh, **zaloge pri pridelovalcih s staro etiketo v uporabi do 31.12.2021!
CHANON nekateri vrste E. Š. in O. pl.	aklonifen	SC	3,0 L/ha	Preem, po setvi pred vznikom fižola	ČU, manjša uporaba , v fižolu (za sveže in suho zrnje).
CLOMATE nekateri vrste E. Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L/ha	Preem, od faze suhega semena do vznika korenin BBCH 00-05	ČU, v fižolu (za suho in sveže zrnje ter stročje).
STOMP AQUA E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	CS	2,9 L/ha	Preem	ČU, manjša uporaba .

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2021, za uporabo v posevkih fižola

po vzniku fižola in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe fižol BBCH	Karenca in opombe
AGIL 100 EC E. in Večl. O. pl	propakvizafop	EC	0,75 – 1,5 L/ha	Po, BBCH 13-29	60 dni
*BASAGRAN 480 , E. in nek. Večl. Š. pl.	bentazon	SL	2,0 L/ha v deljeni (split) aplikaciji	Po, do višine posevka največ	42 dni, uporaba pri temperaturah do 25 °C! V fižolu (za zrnje, s stroki in

			(1,0 + 1,0 L/ha), med aplikacijama 7-14 dni	5 cm	brez strokov).
FOCUS ULTRA E. O. in samosevci žit Večl. O. pl.	cikloksidim	EC	2,0 L/ha oz 1,0 L/ha+1,0L/ha močila DASH HC 4,0 L/ha oz 2,0 L/ha+2,0L/ha močila DASH HC	Po, BBCH 12-19 Po, BBCH 12-19	56 dni fižol v zrnju (suh), 28 dni fižol v stroku, enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29), večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)
FREQUENT E. in Večl. O. pl.	fluazifop-p-butil	EC	2,0 - 3,0 L/ha	Po, BBCH 11-50 od vznika do začetka cvetenja	42 dni, fižol (za stročje in zrnje)
FUSILADE FORTE E. O. pl. in ljulk (<i>Lolium</i> spp.)	fluazifop-p-butil	EC	0,8 - 1,3 L/ha	Po, pred cvetenjem do BBCH 50	90 dni fižol za suho zrnje, 28 dni fižol za stročje
FUSILADE MAX E. in Večl. O. pl. in ljulk (<i>Lolium</i> spp.)	fluazifop-p-butil	EC	1,6 L/ha	Po, pred cvetenjem do BBCH 50	90 dni fižol za suho zrnje, 28 dni fižol za stročje
SELECT SUPER E. O. pl.	kletodim	EC	1,0 L/ha	Po, BBCH 12-19	30 dni, fižol (za stročje in sveže zrnje)

Legenda: **E.** – enoletni, **Večl.** – večletni, **O.** – ozkolistni, **Š.** – širokolistni, **pl.** – pleveli, **Preem** - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, **Po** - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista fižola, **ČU**- karencja je zagotovljena s časom uporabe.

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!

***FFS - velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (WO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!**
Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Datum objave obvestila: 06.05.2021 11:39

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS

