

29. OBVESTILO O VARSTVU ŽITNIH POSEVKOV PRED ŠKODLJIVCI - 10.05.2021 11:31 - Zaključeno



Žitni strgači

V posevkih žit smo v zadnjih dneh prve deкаде aprila opazili odrasle hrošče žitnih strgačev (*Oulema* spp.). Sočasno smo zabeležili prve poškodbe na listih v posevkih pšenice in ječmenov od odraslih hroščev žitnih strgačev. Hroščki povzročajo škodo z najedanjem listov v obliki podolgovatih zarez vzporedno z listnimi žilami.

Na večini opazovanih lokacij smo do konca aprila opazili manjše pojave odraslih hroščev, kateri so se ponekod že tudi parili. Na večini opazovanih lokacij so samice že začele odlagati jajčeca. Iz njih se po 8 do 17 dneh (odvisno od temperatur) izležejo ličinke, ki strgajo zgornjo povrhnjico. Na listih ostanejo bele ozke proge, ob močnejšem napadu pa je večji del listja poškodovan in se suši. 10. maja smo že opazili prve izlegle ličinke žitnih strgačev. Opozorjamo vas, da vestno pregledujete svoje posevke žit in ob presežanju kritičnih števil (pragov škodljivosti) uporabite enega od spodaj navedenih insekticidov. **Odraslih hroščev običajno ne zatiramo**, razen ob res velikih preraszmnožitvah, ko bi tudi odrasli hrošči, ki se le dopolnilno hranijo, lahko povzročili večjo škodo. Cilj zatiranja so **začetni razvojni stadiji ličink**. Pravi čas za zatiranje je, ko se iz jajčec **izleže 10 do 15 % ličink**. Prag škodljivosti je dosežen, ko najdemo povprečno **eno ličinko na posameznem vrhnjem listu** ali **10 ličink žitnih strgačev na m²**. Uporabimo lahko tudi prag **15 % poškodovane površine** najbolj vitalnih zgornjih listov.

Preglednica 1: Fitofarmacevtska sredstva v posevkih, aktivne snovi, odmerki in karence za insekticide v žitih, kateri so registrirani za zatiranje žitnih strgačev v Sloveniji v letu 2021.

FFS: uporaba v posevkih / največ X-krat v eni rastni dobi	AKTIVNA SNOV	ODMEREK (L/ha)	KARENCA (dni)
Bulldock EC 25** (p, j, o, t, r) /2X (**zaloge v uporabi do 20.7.2021)	beta - ciflutrin	0,3 – 0,5	21
Decis 2,5 EC (strna žita) /2X	deltametrin	0,2 – 0,3	30
Evure (p, t, r) / 2X (ozimna žita) (varen za čebele!) 1X (jara žita)	tau-fluvalinat	0,2	30
Fastac 100 EC** (p, j) /2X (**zaloge v uporabi do 30.4.2022)	alfa - cipermetrin	0,12	21
Karate Zeon 5 CS (p, j, o, t, r) /2X	lambda – cihalotrin	0,15	30
Karis 10 CS (p, j, o, t, r) /2X	lambda – cihalotrin	0,05	ČU
Mavrik 240 EW (p, t, r) /2X (ozimna žita) (varen za čebele!) 1X (jara žita)	tau-fluvalinat	0,2	30
Poleci (strna žita) /2X	deltametrin	0,2 – 0,3	30

uporaba v: (p-pšenica, j-ječmen, o-oves, t-tritikala, r-rž)

Z uporabo kateregakoli v tabeli navedenega insekticida, hkrati zatiramo tudi uši v posevkih žit.

Pred uporabo insekticida pozorno preberite priložena navodila in opravite škropljenje v skladu s predpisanimi navodili!

Datum objave obvestila: 10.05.2021 11:31

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

