

42. VARSTVO PEČKARJEV - 01.06.2021 11:54 - Zaključeno



Vremenske razmere narekujejo nadaljevanje rednega varstva pečkatih vrst sadja pred glivičnimi boleznimi, predvsem škrlupom. V prihodnjih dneh pričakujemo postopno izboljšanje vremena vendar možnost ploh še vedno ostaja. Zato pridelovalcem priporočamo redno spremljanje aktualnih vremenskih napovedih. Fungicidno oblogo je zaradi hitrega priraščanja potrebno obnavljati na 5-7 dni oziroma pred napovedanimi padavinami. Za škropljenje lahko uporabite enega izmed dotikalnih pripravkov kot so **Delan PRO, Delan 700 WG, Alcoban,**

Avtar 75 NT, Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 480 SC, Scab 80 WG, Curatio-žvepleno apnena brozga. Na voljo so tudi fungicidni pripravki s sistemskim delovanjem kot so **Chorus 50 WG, Mythos, Pyrus 400 SC, Batalion 450 SC, Scala, Score 250 EC, Mavita 250 EC, Difenzone, Domark 100 EC, Difcor 250 EC, Duaxo koncentrat**). Uporaba slednjih je upravičena le v primeru, če niste uspeli opraviti škropljenja pred dežjem in so bili hkrati izpolnjeni pogoji za okužbo. Sistemskim sredstvom je nujno potrebno dodati kontaktni fungicid razen pripravku **Faban**.

V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost pripravkom na osnovi **kaptana** kot so **Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC**.

Za varstvu pred **jablanovo pepelovko** dodajte škropilni brozgi enega izmed žveplovih pripravkov. Ti so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V močno okuženih nasadih lahko uporabite tudi naslednja sredstva **Luna experience, Strobly WG, Zato Plus, Zato 50 WG, Tercel, Sercadis in Sercadis plus**. Pred škropljenjem izrežite in odstranite plesnive poganjke iz nasada.

Sedaj je čas za zatiranje krvave uši. Škropljenje opravite v primeru, da je presežen prag škodljivosti, 12 kolonij na 100 pregledanih poganjkov oz. 5 do 8 % napadenih vej. Uporabite lahko sredstva **Pirimor 50 WG** ali **Movento SC 100**. Slednjemu dajte prednost, če imate težave tudi z ostalimi sesajočimi in grizočimi organizmi kot so listne uši, kaparji in jablanova hrčica.

Insekticidni pripravki so nevarni za čebele, zato jih uporabite le, če je sadno drevje že popolnoma odcvetelo (venčni listi so že odpadli)! Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast!

V preteklem tednu smo beležili povečevanje naleta metuljčkov **jabolčnega zavijača**. Relativno visokim ulovom navkljub, pogoji za parjenje in odlaganje jajčec na opazovanih lokacijah še niso bili izpolnjeni. Izpolnjene pogoje pričakujemo ob prvi, več dni trajajoči otoplitvi. O ustreznem terminu zatiranja vas bomo sprti obveščali.

Pridelovalci bodite pozorni na znake primarnih okužb z **bakterijo hruševega ožiga** in v primeru suma obvestite fitosanitarno inšpekcijo ter vam najbližjo javno službo varstva rastlin.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!

Datum objave obvestila: 01.06.2021 11:54

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

Seznam registriranih FFS

