



50. VARSTVO VINSKE TRTE - 01.07.2021 13:30 - Zaključeno



Fenološki razvoj vinske trte

Vinska trta je v povprečju na opazovane lokacije in sorte zaključila fenološko fazo cvetenja BBCH 69 in prehaja v fazo razvoja plodičev BBCH 71.

Grozdni sukači

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Konjice smo na večina opazovanih lokacijah med 28. in 30. junijem zabeležili prve ulove druge generacije grozdnih sukačev. Na feromonskih vabah se povečuje predvsem število križastih grozdnih sukačev.

Tisti, ki ste se odločili, da škropljenje proti drugemu rodu grozdnih sukačev opravite s pripravkom **Insegar 25 WG** (0,6 kg/ha), to storite **do 6. julija**. Za uporabo pripravkov kot so: **Coragen** (0,15 L/ha), **Affirm** (1,5 kg/ha), **Mimic** (0,6 L/ha), **Radiant** (0,35 L/ha), **Steward** (150 g/ha), **Laser plus** (0,2 L/ha), ali **Vertimec pro** (0,75 L/ha), pa je optimalen rok za zatiranje **med 6. in 13. julijem**.

V napovedanem roku lahko za zatiranje grozdnih sukačev uporabite tudi pripravke na osnovi bakterije *Bacillus thuringiensis* kot so: **Delfin WG** (0,75 kg/ha), **Lepinox Plus** (1 kg/ha) ali **Agree WG** (1 kg/ha). S pripravkom Delfin WG je potrebno škropiti dvakrat v presledku 14 dni, s pripravkoma Lepinox Plus ali Agree WG pa največ 3 krat v presledku 7 do 10 dni.

Peronospora in oidij vinske trte

Vinska trta še vedno bujno raste, zato poskrbite, da da bo listna masa stalno zaščitena.

V primeru ploh in neviht za preprečevanje novih okužb s peronosporo opravite škropljenje vinske trte z enim od kombiniranih, sistemsko ali polsistemsko delujočih pripravki kot so: **Forum star** (1,6 kg/ha), **Sfinga Exstra WDG** (1,5 kg/ha), **Forum MZ WG** (2,5 kg/ha), **Acrobat MZ** (2,5 kg/ha), **Sanvino** (0,75 kg/ha), **Orvego** (0,8 L/ha), **Mikal flash** (4 kg/ha), **Mikal premium F** (3 kg/ha), **Momentum trio** (3kg/ha) ali **Magma triple WG** (3kg/ha).

V času formiranja grozdnih jagod dajte prednost kombiniranim, sistemsko ali polsistemsko delujočim pripravkom kot so: **Pergado – F** (3 kg/ha), **Pergado MZ** ali **Gett** (2,5 kg/ha), **Pergado D** (1,4L/ha), **Ampexio** (0,5 kg/ha) ali **Profiler** (3 kg/ha).

Škropljenje lahko opravite tudi s pripravki kot so: **Folpan gold** (2 kg/ha), **Ridomil Gold MZ Pepite** (2,5 kg/ha), **Armetil M** (2,5 kg/ha), , **Electis 75 WG** (1,5 – 1,8 kg/ha) ali **Reboot** (0,4 kg/ha).

Toplo vreme v primeru visoke nočne in jutranje relativne zračne vlage ustvarja pogoje za okužbe z **oidijem vinske trte**. Za preprečevanje okužb proti oidiju opravite škropljenje z enim od naslednjih pripravkov: **Collis** (0,4 L/ha), **Luna Experience** (0,375 L/ha), **Luna max** (1L/ha), **Talendo extra** (0,08 – 0,2 L/ha), **Talendo** (0,25 L/ha), **Vivando** (0,16 L/ha), **Custodia** (0,35 L/ha), **Domark 100 EC** (0,3 L/ha) **Misha 20 EW** (0,23 L/ha), **Sythane 20 EW** (0,14 L/ha), **Karathane Gold 350 EC** (0,5 L/ha), **Kusabi 300 SC** (0,25 L/ha), **Dynali** (0,65 L/ha) **Topas 100 EC** (0,3L/ha), **Topaze** (0,3 L/ha), **Score 250 EC** (0,2 L/ha), **Mavita 250 EC** (0,2 L/ha), **Difcor 250 EC** (0,12 L/ha), **Spirox D** (0,5 L/ha), **Sercadis** (0,15 L/ha), **Unicorn DF** (2,2 kg/ha), **Prosper CS 300** (1L/ha), **Nativo 75 WG** (0,16kg/ha) ali uporabite pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: **Folicur EW 250** (0,4 L/ha), **Orius 25 EW** (0,4 L/ha), **Mystic 250 EC** (0,4 L/ha.), **Tebusha 25%EW** (0,4 L/ha), **Baltazar** (0,4 L/ha) ali **Star Tebukonazol** (0,4 L/ha).

Uporabite lahko tudi pripravek **Cabrio Top** (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte.

Za zmanjševanje okužb proti oidiju lahko uporabite tudi priprava na osnovi kalijevega hidrojen karbonata kot sta: **Vitisan** (6 kg/ha) ali **Karbicare** (5kg/ha), ki sta registrirana tudi v ekološki pridelavi.

Prav tako lahko dodate pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: **Cosan**, **Kumulus DF**, **Microthiol special**, **Microthiol disperss**, **Pepelin**, **Thiovit Jet** ali **Vindex 80 WG** - v odmerku 3 do 8 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC**, **Pol- Sulphur 80 WG**, **WP**, **Pol- Sulphur 800 SC**, **Symbiotica fito – granulirano žveplo**, **Symbiotica fito – tekoče žveplo** - v odmerku 4L - kg/ha ali **Azumo WG** v odmerku 4-8 kg/ha ali **Cosavet DF**, **Močljivo žveplo Karsia DF** v odmerku do 3,6-8 kg/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi **Cosinus** v odmerku 8 kg/ha. Ob tako visokih temperaturah zraka (nad 30 °C), škropite izključno zgodaj zjutraj ali pozno zvečer.

Toča

V primeru toče dajte pri škropljenju prednost pripravkom, ki vsebujejo aktivno snov folpet kot so: **Forum star**, **Sfinga Exstra WDG**, **Folpan gold**, , **Sanvino**, **Mikal flash**, **Mikal premium F**, **Momentum trio**, **Magma triple WG** ali **Pergado F..**

Datum objave obvestila: 01.07.2021 13:30

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

Seznam registriranih FFS

