



58. VARSTVO JAGODIČJA - 05.07.2021 10:48 - Zaključeno



Pridelovalce jagodičastega sadja opozarjamo, da v nasadih spremljajo pojav plodove vinske mušice. Mušica začne odlagati jajčeca v času barvanja oz. zorenja plodov. Škodo povzročajo ličinke (žerke), ki se prehranjujejo v notranjosti zorečih plodov. Za spremljanje naleta svetujemo rabo prehranskih vab, ki jih postavite v senco oz. grmovje na robu nasada, saj mušica ne mara direktnega sonca.

Vabe lahko naredite sami. V pollitrsko plastenko z izvrtanimi luknjicami (5-6 mm) na zgornjem delu, nalijte 1 dl mešanice vinskega kisa in rdečega vina v razmerju 3:1, z dodano žličko sladkorja in nekaj kapljic detergenta. Vabe pregledujte dnevno oz. po potrebi. Več o škodljivcu si lahko preberete na spletni povezavi: <https://www.ivr.si/skodljivci/plodova-vinska-musica/>.

Za zatiranje plodove vinske mušice na malinah, robidah, borovnicah, ribezu, kosmuljah in brusnicah sta redno registrirani sredstvi **Laser 240 SC** in **Laser Plus**. Zaradi izjemno hitrega razvojnega kroga škodljivca je priporočeno opraviti škropljenje v razmakih 7 do 10 dni. Izjemno dovoljenje za uporabo na rozgastem in drugem drobnem sadju ter jagodičevju je v letošnjem letu pridobilo tudi sredstvo **Asset Five**. Vsa sredstva so dovoljena tudi v ekološki pridelavi.

Datum objave obvestila: 05.07.2021 10:48

Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

