

62. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 05.07.2021 10:51 - Zaključeno



Jablanov škrlup, jablanova pepelovka in listne pegavosti

Za varstvo pečkatih vrst sadja pred škrlupom priporočamo uporabo dotikalnih fungicidov na osnovi kaptana kot so **Merpan 80 WDG**, **Merplus**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 480 SC**, **Scab 80 WG**, še vedno pa lahko uporabite tudi ostale pripravke z dotikalnim delovanjem. Pri tem upoštevajte karence in število uporab na istem zemljišču, ki so opisane v registraciji. V ekološki pridelavi je možnost uporabe žvepleno apnene brozge **Curatio** ter sredstvo **Vitisan**.

V nasadih, kjer imate težave z jablanovo pepelovko lahko dodate škropilni brozgi pripravke na osnovi **močljivega žvepla**. Plesnive poganjke redno izrezujete in odstranjujete iz nasadov.

V ekoloških sadovnjakih lahko listne pegavosti povzročijo prezgodnje odpadanje listja, kar negativno vpliva na vitalnost drevja. Zato bodite pozorni na njihov pojav in opravite škropljenja s sredstvi na osnovi kislih glin kot je pripravek za krepitev rastlin **Myco-sin** ter pripravek **Vitisan**. Priporočljiva je izmenična uporaba zgoraj omenjenih sredstev.

V primeru neurij s točo priporočamo uporabo FFS na osnovi kaptana (**Merpan 80 WDG**, **Merplus**, **Orthocide 80 WG**, **Scab 480 SC**, **Scab 80 WG**).

Jabolčni zavijač

V nasadih, kjer je od prvega škropljenja proti jabolčnemu zavijaču minilo več kot dva tedna in ulovi na feromonskih vabah presegajo prag škodljivosti (7 do 10 metuljkov/teden), je potrebno opraviti drugo škropljenje. Uporabite lahko sredstva **Coragen**, **Exirel**, **Mimic**, **Delegate**, **Laser Plus** in **Imidan 50 WG**, **Affirm**, **Affirm opt** ter pripravka na osnovi virusa granuloze **Madex max** in **Carpovirusine**. V nasadih, kjer imate težave z tudi ušmi in stenicami priporočamo uporabo pripravka **Mospilan 20 SG**. Ekološki pridelovalci lahko uporabite virus granuloze **Madex max** in **Carpovirusine** in insekticid **Laser Plus**. Za varstvo pred drugimi škodljivimi gosenicami so na voljo sredstva **Agree**, **Lepinox plus** ali **Delfin WG**. Opozarjamo, da imajo virusni pripravki in pripravki na osnovi izločkov bakterij, ki so izpostavljeni sončnemu sevanju, krajšo učinkovitost delovanja, zato je potrebno škropljenje opraviti večkrat v ustreznem času.

Insekticidi so nevarni za čebele, zato škropite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so čebele v panjih. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast!

Datum objave obvestila: 05.07.2021 10:51

Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije

Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič

Pripravili: **David Snoj, Primož Žigon**. Uredila: **Meta Zemljič**

[Seznam registriranih FFS](#)

