



89. BVESTILO O VARSTVU POZNEGA KROMPIRJA - 15.07.2021 11:51 - Zaključeno



V nižinah Primorske se je izkop zgodnjega krompirja že končal, na ostalih višjih območjih (postojnsko, idrijsko, tolminsko) pa so (letos nekoliko pozneje) pozne sorte krompirja v cvetenju. Zaradi zelo visokih temperatur in suhega vremena do sedaj ni bilo večje nevarnosti razvoja okužb s krompirjevo plesnijo. Po napovedanih poletnih nevihtah pa bodo nastali odlični pogoji za razvoj okužbe, zato priporočamo nadaljevanje varstva proti krompirjevi plesni. Ponekod opazamo tudi napad koloradskega hrošča. Priporočamo redno pregledovanje posevkov in po potrebi tudi zaščito z enim od registriranih sredstev.

V Vipavski dolini in v Slovenski Istri so rani krompir že izkopali, drugod v višjih območjih Primorske, pa so nasadi krompirja strnili vrste in pozne sorte cvetijo. Vlažni in topli pogoji v nasadih krompirja po poletnih nevihtah predstavljajo idealne pogoje za širitev krompirjeve plesni, ki je na nekaterih nezaščitene nasadih krompirja že povzročila rjavenje listov in propad cime.

V primeru nadaljevanja nestanovitnega vremena (plohe, nevihte), se bodo odlični pogoji za širjenje krompirjeve plesni nadaljevali. Krompir je potrebno pred dežjem zaščititi proti krompirjevi plesni s sistemiki ali polsistemiki (glej predhoden seznam), sicer sledi izbruh bolezni in propad cime ter posledično gnitje gomoljev.

V primeru, ko opazimo v nasadu posamezne liste ali rastline napadene s krompirjevo plesnijo priporočamo škropljenje s fungicidi na osnovi dimetomorfa (Acrobat, Forum, Banjo forte, Orvego, ipd.) ali cimoksanila (Moximate, Nautile, Equation pro, Tanos, Sacron, ipd.) in ponovitev škropljenja po 7 dneh. Enako ravnejte v primeru poškodb nasada zaradi toče.

Za ekološko zaščito krompirja nadaljujte z uporabo dovoljenih BAKRENIH PRIPRAVKOV.

Škropljenja ponavljamo v skladu z navodili za uporabo FFS. Priporočamo, da sredstva s sistemskim in polsistemskim delovanjem menjujete, da se izognete pojavi odpornosti! Pri izkopu krompirja pazite na karenci!

V primeru, da je večina listov propadla zaradi krompirjeve plesni, priporočamo odstranitev cime s površine krompirišča. Z izkopom počakamo dokler se pokožica na gomoljih ne utrdi, da se izognemo še dodatni okužbi gomoljev.

Priprava: Anka Poženeš, univ.dipl.inž.agr.

Datum objave obvestila: 15.07.2021 11:51

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

