



97. OBVESTILO O VARSTVU PLODOVK IN BUČNIC - 26.07.2021 13:47 - Zaključeno



Pršice

Na plodovkah gojenih na njivskih površinah in v rastlinjakih opazamo poškodbe, ki jih povzročajo **pršice**. Populacijo pršic lahko omejimo z zatiranjem plevelov in odstranjevanjem poškodovanih rastlin. Ob pojavu pršice rastline škropimo z registriranimi akaricidnimi sredstvi.

Sredstvo	Odmerek ali koncentracija	Uporaba	Dovoljeno na	Karenca
COSAN	Bučnice: 5-7,5 kg/ha (BBCH 13-87)	Na prostem	kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah	3 dni
	Plodovke: 5-8 kg/ha (BBCH 15-69)		paradižniku, papriki in jajčevcu	
KANEMITE SC	V zaščiteneh prostorih: - rastlina visoka do 50 cm 0,625 l/ha pri porabi 600 l vode na ha - rastlina visoka med 50 in 125 cm 0,938 l/ha pri porabi 900 l vode na ha - rastlina višja od 125 cm 1,25 l/ha pri porabi 1200 l/ha Na prostem: 1,25 l/ha pri največji porabi vode 600 l na ha	Na prostem / v zaščiteneh prostorih	kumarah	3 dni
KUMULUS DF	Bučnice: 5-7,5 kg/ha (BBCH 13-87) Plodovke: 5-8 kg/ha (BBCH 15-69)	Na prostem	kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, paradižniku, papriki in jajčevcu	3 dni
MICROTHIOL DISPERSS	Bučnice: 5-7,5 kg/ha (BBCH 13-87) Plodovke: 5-8 kg/ha (BBCH 15-69)	Na prostem	kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, paradižniku, papriki in jajčevcu	3 dni
MICROTHIOL SPECIAL	Bučnice: 5-7,5 kg/ha (BBCH 13-87) Plodovke: 5-8 kg/ha (BBCH 15-69)	Na prostem	kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, paradižniku, papriki in jajčevcu	3 dni
NISSORUN 10 WP	Na paradižniku, papriki in jajčevcih v odmerku 1 kg/ha (10 g na 10 l vode na 100 m ²);	V zaščiteneh prostorih / kumarice za vlaganje – na	paradižniku, papriki in jajčevcih; dinjah, lubenicah,	3 dni

	na dinjah, lubenicah, bučah in drugih bučnicah z neužitno lupino v odmerku 0,8 kg/ha (8 g na 10 l vode na 100 m²); na kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah in drugih bučnicah z užitno lupino v odmerku 0,8 kg/ha (8 g na 10 l vode na 100 m²); na kumaricah za vlaganje, gojenih na prostem v odmerku 0,8 kg/ha (8 g na 10 l vode na 100 m²);	prostem in v zaščiteneh prostorih	bučah in drugih bučnicah z neužitno lupino; kumarah, kumaricah za vlaganje, bučkah in drugih bučnicah z užitno lupino; a kumaricah za vlaganje, gojenih na prostem	
NISSORUN 250 SC	na paradižniku, paprika in jajčevcih: - rastlina visoka do 50 cm - v odmerku 0,16 l/ha pri porabi 600 l vode na ha, - rastlina visoka med 50 in 125 cm - v odmerku 0,24 l/ha pri porabi 900 l vode na ha, - rastlina višja od 125 cm - v odmerku 0,32 l/ha pri porabi 1200 l vode na ha; na kumarah, bučkah, bučah, dinjah, lubenicah in drugih bučnicah z užitno in neužitno lupino: - rastlina visoka do 50 cm - v odmerku 0,16 l/ha pri porabi 600 l vode na ha, - rastlina visoka med 50 in 125 cm - v odmerku 0,24 l/ha pri porabi 900 l vode na ha, - rastlina višja od 125 cm - v odmerku 0,32 l/ha pri porabi 1200 l vode na ha.	V zaščiteneh prostorih	paradižniku, paprika in jajčevcih; kumarah, bučkah, bučah, dinjah, lubenicah in drugih bučnicah z užitno in neužitno lupino	3 dni
OROCIDE PLUS	v odmerku 0,4 do 0,8 l/hl, pri čemer najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči 8 l/ha. Višjo koncentracijo se uporabi v primeru intenzivnega napada pršic. Priporočena poraba vode je 200-1000 l/ha in se jo prilagodi višini rastline	V zaščiteneh prostorih	plodovkah iz družine razhudnikov, kot so npr. paradižnik, paprika in pekoča paprika (čili)	1 dan
ORTUS 5 SC	v 0,15 % koncentraciji (15 ml na 10 l vode), ob izhodiščni porabi vode 1000 l/ha (10 l na 100 m ²)	V zaščiteneh prostorih	paradižniku, jajčevcih, papriki, kumarah, bučkah	7 dni

	pri čemer najvišji odmerek ne sme preseči 1,5 l/ha			
PEPELIN	Bučnice: 5-7,5 kg/ha (BBCH 13-87) Plodovke: 5-8 kg/ha (BBCH 15-69)	Na prostem	kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, paradižniku, papriki in jajčevcu	3 dni
PREV-GOLD	v odmerku 0,4 do 0,8 l/hl, pri čemer najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči 8 l/ha. Višjo koncentracijo se uporabi v primeru intenzivnega napada pršic. Priporočena poraba vode je 200-1000 l/ha in se jo prilagodi višini rastline.	V zaščitениh prostorih	plodovkah iz družine razhudnikov, kot so npr. paradižnik, paprika in pekoča paprika (čili)	1 dan
PREV-GOLD GARDEN	v odmerku 0,4 do 0,8 l/hl, pri čemer najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči 8 l/ha. Višjo koncentracijo se uporabi v primeru intenzivnega napada pršic. Priporočena poraba vode je 200-1000 l/ha in se jo prilagodi višini rastline.	V zaščitениh prostorih	plodovkah iz družine razhudnikov, kot so npr. paradižnik, paprika in pekoča paprika (čili)	1 dan
REQUIEM PRIME	5 l/ha na višinski meter rastline, pri čemer najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči 10 l/ha. Priporočena poraba vode je 750 l/ha na višinski meter rastline. Na bučah in lubenicah: 6,5 l/ha in porabi vode 500 do 1000 l/ha	V zaščitениh prostorih	na papriki in jajčevcih; kumarah, bučkah in dinjah; bučah in lubenicah	1 dan
THIOVIT JET	Bučnice: 5-7,5 kg/ha (BBCH 13-87) Plodovke: 5-8 kg/ha (BBCH 15-69)	Na prostem	kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, paradižniku, papriki in jajčevcu	3 dni
VERTIMEC PRO	Na dinjah, lubenicah in bučah v 0,075 % koncentraciji pri izhodiščni porabi vode 1000 l/ha (0,75 l/ha oz. 7,5 ml/100 m ² oz. 75 ml/100 l vode); na bučkah, kumarah in kumaricah za vlaganje, papriki, jajčevcu in	Na prostem / v zaščitениh prostorih	dinjah, lubenicah in bučah (v zaščitениh prostorih); bučkah, kumarah in kumaricah za vlaganje (na prostem in v zaščitениh prostorih);	3 dni

	paradižniku v največjem dovoljenem odmerku 1,125 l/ha (11,25 ml/100 m2) oziroma 75 ml/100 l vode;		papriki in jajčevcu (na prostem in v zaščitениh prostorih); paradižniku (na prostem in v zaščitениh prostorih)	
VERTIPIN	7,5 l/ha pri porabi vode 300-1000 l/ha	Na prostem / v zaščitениh prostorih	Na paradižniku in jajčevcu za zatiranje paradižnikove rjaste pršice	3 dni
VINDEX 80 WG	Bučnice: 5-7,5 kg/ha (BBCH 13-87) Plodovke: 5-8 kg/ha (BBCH 15-69)	Na prostem	kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah, paradižniku, papriki in jajčevcu	3 dni

POZOR: Sredstva na osnovi žvepla so lahko fitotoksična, če se jih uporablja pri temperaturah zraka višjih od 25°C ter pri uporabi na nekaterih sortah ali hibridih. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Datum objave obvestila: 26.07.2021 13:47
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: **Marko Devetak**
[Seznam registriranih FFS](#)

