



72. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št. 10 - 29.07.2021 07:21 - Zaključeno



Večina sort vinske trte je trenutno v fenološki fazi BBCH 79-81 (večina jagod se med seboj dotika - začetek sortno značilnega barvanja).

Nevarnost okužb s **peronosporo vinske trte** še ni minila. Za naslednja škropljenja priporočamo uporabo enega izmed kombiniranih pripravkov (sistemski oz. polsistemski + kontaktni) kot so: **Acrobat MZ WG** (2,5 kg/ha), **Ampexio** (0,5 kg/ha), **Armetil M** (2,5 kg/ha), **Curzate M 72,5 WG** (2,3 kg/ha), **Cymbal** (0,25 kg/ha), **Electis 75 WG** (1,5-1,8 kg/ha), **Emendo F** (1,5 kg/ha), **Enervin** (2,5 kg/ha), **Equation pro** (400 g/ha), **Fortuna gold** (3 kg/ha), **Forum MZ WG** (2,5 kg/ha), **Forum star** (1,6 kg/ha), **Fudan gold** (3 kg/ha), **Gett** (2,5 kg/ha), **Mikal Flash** (4 kg/ha), **Mikal premium F** (3 kg/ha), **Momentum F** (4 kg/ha), **Momentum trio** (3 kg/ha), **Orvego** (0,8 L/ha), **Pergado F** (3 kg/ha), **Pergado D** (1,4 L/ha), **Pergado MZ** (2,5 kg/ha), ali **Pergado SC** (0,6 L/ha) ali **Reboot** (0,4 kg/ha), **Revus** (0,6 l/ha), **Ridomil gold MZ Pepite** (2,5 kg/ha), **Sanvino** (1,5 kg/ha), **Sfinga Extra WDG** (1,5-2 kg/ha), **Tanos 50 WG** (0,4 kg/ha), **Twingo** (3 kg/ha) ali **Valis F** (2 kg/ha) ali **Zorvec Zelavin** (0,6 L/ha). Presledki med škropljenji so lahko dolgi 12-14 dni, v primeru obilnejših padavin pa jih je potrebno skrajšati.

Uporabiti je mogoče tudi kombiniran pripravek z bakrom **Pergado C** (4–5 kg/ha).

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: **Daimyo F** (2,5 L/ha) ali **Mildicut** (4 L/ha) ali **Videryo F** (2,5 L/ha) ali **Vincy F** (2,5 L/ha).

Pripravkom **Cymbal**, **Equation pro**, **Pergado SC** in **Revus** priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

V **ekološki pridelavi** lahko za zatiranje peronospore uporabite enega izmed naslednjih bakrovih pripravkov: **Badge WG** ali **Cuprblau Z 35 WG** ali **Cuprblau Z 35 WP** ali **Cuprblau Z Ultra WP** ali **Cuproxat** ali **Kocide 2000** ali **Nordox 75 WG**.

Za preprečitev okužbe z **oidijem vinske trte** priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: **Baltazar** (0,4 L/ha), **Collis SC** (0,4 l/ha), **Custodia** (0,7 L/ha), **Domark 100 EC** (0,3 L/ha), **Difcor 250 EC** (0,12 L/ha), **Dynali** (0,65 l/ha), **Folicur EW 250** (0,4 L/ha), **Karathane Gold 350 EC** (0,6 l/ha), **Karbicure** (5 kg/ha), **Kusabi 300 SC** (0,3 L/ha), **Mavita 250 EC** (0,2 l/ha), **Misha 20 EW** (0,23 l/ha), **Mystic 250 EC** (0,4 L/ha), **Nativo 75 WG** (0,16 kg/ha), **Orius 25 EW** (0,4 l/ha), **Prosper CS 300** (1 L/ha), **Score 250 EC** (0,2 L/ha), **Sercadis** (0,15 L/ha), **Star Tebukonazol** (0,4 l/ha), **Sythane 20 EW** (0,14 L/ha), **Tebusha 25% EW** (0,4 L/ha), **Topas 100 EC** (0,3 l/ha), **Topaze** (0,3 l/ha), **Unicorn DF** (2,2 kg/ha) ali **Vitisan** (12 kg/ha).

Lahko uporabite tudi pripravek **Universalis** (2 L/ha), ki zaradi kontaktne komponente deluje tudi proti peronospori vinske trte.

Sredstvom za zatiranje **oidija** lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Azumo WG** (4-8 kg/ha) ali **Cosan** ali **Kumulus DF** ali **Microthiol special** ali **Microthiol Disperss** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC** (4 L/ha) ali **Pol-Sulphur 80 WG, WP** (4 kg/ha) ali **Pol-Sulphur 800 SC** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – tekoče žveplo** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – granulirano žveplo** (4,0 kg/ha) ali **Cosinus** oziroma **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** (8 kg/ha – v primeru pojava oidija). **Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti.**

V primeru pojava **neurij in toče** imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (**Forum star**, **Sfinga extra WDG**, **Pergado F** in podobni). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so **Protifert LMW**, **Algoplasmin** ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 29.07.2021 07:21

Obvestilo prognoističnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024