



5. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 18.03.2022 13:53 - Zaključeno



Brsti se pri jablani in zlasti hruški razpirajo, na večini leg so že opazne tudi konice zelenih listkov (53 – 54 po lestvici BBCH).

Pri rednem spremljanju razvoja **jablanovega škrupa** smo pribeležili zrelost zimskih trosišč v prvih dneh meseca marca in razvite ter in dozorele zimske spore v prvi dekadi meseca. Odsotnost padavin še ne omogoča izbruhov zimskih spor.

Skladno z razvojem nasadov priporočamo preventivno varstvo s pripravki na osnovi bakra. Tretiranje je priporočljivo zlasti zaradi širšega fungicidnega in baktericidnega delovanja proti številnim povzročiteljem **bolezni lesa** jablane (*jablanov rak*, *gniloba koreninskega vratu*,...) in hruške, ki nastopajo ob zimski rezi ter drugih fizičnih poškodbah in **hruševemu ožigu** [npr. BADGE WG (2,9 kg/ha) ali NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha; tudi proti *jablanovemu raku*)]. Uporabite lahko: **CUPRABLAU Z 35 WP** (3,0 kg/ha), **CUPRABLAU Z 35 WG** (3,0 kg/ha), **CUPRABLAU Z 50 WP** (2,0 kg/ha), **KOCIDE 2000** (2,0 kg/ha).

V teh dneh obstaja velika nevarnost napadov **jablanovega cvetožera**. Pri pregledih izpostavljenih nasadov beležimo precejšnjo stopnjo napadenih brstov, v katere hroščki že odlagajo jajčeca. Izpostavljeni nasadi se nahajajo v bližini gozda, oz. visokodebelnih dreves jablane. Prisotnost ugotavljate z otresanjem vej nad svetlo podlago in pregledovanjem brstov na vbode. Ko bo presežen prag škodljivosti (15 % [v nasadih z manjšim cvetnim nastavkom] do 30 % navrtanih brstov), pride v poštev varstvo nasadov s pripravkom **IMIDAN 50 WG** (1 kg/ha; nevaren za čebele; uporaba najkasneje 14 pred cvetenjem) ali **ASSET FIVE** (0,96 l v 1500 l vode na ha; ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvo rastlin), ki pride v poštev tudi v ekološki pridelavi. Oba pripravka boljše delujeta pri temperaturah nad 10 °C.

V tem obdobju je v nasadih, kjer je ugotovljena visoka stopnja odloženih **zimskih jajčec listnih uši** in **rdeče sadne pršice**, priporočena raba oljnih pripravkov kot sta: **OVITEX** (20 l/ha; velika poraba vode) ali **FRUTAPON** (30 l/ha; velika poraba vode).

Svetujemo tudi zaščitni pristop z **metodo odvracanja sesajočih žuželk** (predvsem **hruševih bolšic**) z nanosom **kaolinskih glin**. Ob povečani porabi vode (700-1000 l/ha) lahko uporabite npr. CUTISAN ali MALUSAN (odmerek 30 kg/ha), fino mleti kaolin brez primesi, sicer namenjen zmanjšanju mrežavosti plodov jablan in hrušk. Nanos je smiselno do konca brstenja večkrat ponoviti. Število ponovitev je odvisno od trajanja odlaganja jajčec hruševih bolšic in intenzivnosti izpiranja ob padavinah. Pristop je možno uporabiti v integrirani ekološki pridelavi sadja.

V nasadih jablan bodite pozorni na nalet **vrtnih zavrtačev**, hroščkov iz skupine podlubnikov, kateri so aktivni z vsakim toplejšim dnevom. Hroščki z zavrtavanjem v deblo in poganjke izčrpajo sadike in starejša obolela drevesa, ki zato kmalu propadejo. Njihovo številčnost lahko zmanjšujete s pomočjo **alkoholnih pastí** (rdeče barvne plošče REBELL ROSSO ali jih sestavite sami iz rumenih lepljivih plošč, pod katere namestite 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 18.03.2022 13:53

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

[Seznam registriranih FFS](#)

