

10. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.1 - 25.03.2022 13:38 - Zaključeno



Zgodnje sorte jabolčan in hrušk so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo C – C₃ po Fleckingerju oz. BBCH 53 - 54 (odpiranje brsta – stadij mišjega ušesca).

Pregled zimskih plodišč **jablanovega škrupa** je pokazal, da so askospore v posameznih plodiščih že dozorele. Do prvih primarnih okužb lahko pride le v primeru, če bo zaradi padavin listje in že odprti brsti mokri daljši čas (pri povprečni temperaturi 8°C - 20 ur) in to predvsem v nasadih, kjer lanskoletno listje iz nasada ni bilo odstranjeno – pometeno in kjer so jablane dosegle zgoraj omenjeno fenološko fazo.

V primeru vremenske napovedi z obilnimi padavinami (nad 10 L/m²) je potrebno poškropiti jablane in hruške, ki so v razvoju hitreje in to **še pred napovedanimi padavinami**. Priporočamo uporabo enega od bakrovih pripravkov: **Cuprblau Z 35 WP (3 kg/ha)**, **Cuprblau Z 35 WG (3 kg/ha)**, **Cuprblau Z 50 WP (2 kg/ha)** ali **Kocide 2000 (2 kg/ha)**. **Vsi naštetni bakrovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.**

V nekaterih nasadih smo ujeli hroščke **jablanovega cvetožerja**, našli smo vbode (med 3% in 26% nabodenih brstov), na nekaterih lokacijah pa tudi že odložena jajčeca. Priporočamo pregled nasadov, predvsem tistih, kjer je škoda v preteklih letih že bila ugotovljena in nasadov v bližini gozdov. V teh nasadih priporočamo, da pregledate najbolj razvite cvetne brste – prag škodljivosti je presežen kadar je nabodenih več kot 15% brstov (pri šibkem cvetnem nastavku) oz. 30% (pri močnem nastavku).

V nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti priporočamo uporabo pripravka **Imidan 50 WG v odmerku 1 kg/ha**. Jablane se lahko tretira najpozneje do 14 dni pred začetkom cvetenja (uporaba dovoljena enkrat v eni rastni dobi). **Pripravek je strupen za čebele**, zato je potrebno pred njegovo uporabo cvetočo podrast odstraniti (košnja, mulčenje). **Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.**

Po izkušnjah iz tujine se priporoča znižanje pH vrednosti škropilne brozge, katere vrednost za optimalno delovanje pripravka Imidan 50 WG naj znaša med 6 – 6,5.

Za zatiranje jablanovega cvetožerja ima dovoljenje za nujne primere pripravek na osnovi piretrina **Asset five**, ki ima dovoljenje za uporabo tudi v **ekološki pridelavi**. Uporablja se v 0,064 % koncentraciji (0,96 L v 1500 L vode na ha), v razvojni fazi B – C₃ (BBCH 51 – 54).

Tretiranje se po potrebi ponovi 7 dni po predhodnem. Priporočeni pH škropilne brozge je od 5 do 6. Škropilno brozgo je zato treba po potrebi zakisati z dodatkom citronske kisline (ekološka pridelava) ali sredstva Pekacid.

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat.

Pripravek Asset five je na voljo samo znanim kupcem in ne sme biti v prosti prodaji. Podrobnejše informacije o prodaji in vodenju evidenc uporabe so vam na voljo pri zastopniku, podjetju METROB d.o.o.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 25.03.2022 13:38

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

