

14. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.2 - 29.03.2022 11:28 - Zaključeno



Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo BBCH 54 (stadij mišjega ušesca) do 55 (vidni še zaprti cvetni popki), na nekaterih lokacijah in sortah pa so jabolane šele dosegle fenološko fazo BBCH 53 - 54 (odpiranje brsta – stadij mišjega ušesca).

Glede na hiter razvoj jablan in hrušk za zatiranje **kaparjev, jajčec rdeče sadne pršice in jajčec listnih uši**, ki prezimijo na lesu, priporočamo uporabo parafinskega olja **Frutapon** (30 L/ha) ali **Ovitex** (20 L/ha) ali olja oljne ogrščice **Celaflor Naturen naravni insekticid za sadje, vrtnine in okrasne rastline – koncentrat** v 3 % koncentraciji.

Učinkovitost delovanja olj je boljša v oblačnem vremenu in ob višji relativni zračni vlagi. Po podatkih iz tujine večjo učinkovitost delovanja olj dosežemo z 'dvojno aplikacijo' iste vrste v nasprotnih smereh vožnje (v tem primeru se za posamezno smer vožnje uporabi polovični odmerek).

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 29.03.2022 11:28

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

