

7. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV IB BOLEZNI V OLJNI OGRŠČICI - 29.03.2022 14:28 - Zaključeno



Fenološki razvoj oljne ogrščice

Oljna ogrščica je na območju jugovzhodne Slovenije na večini lokacij v fenološkem razvoju pojava socvetja (50 – 55 po BBCH).

Zatiranje škodljivcev repičarja (*Meligethes aeneus*) in repičnega kljunotaja (*Ceutorhynchus napi*)

Prag (5 hroščev/posodo na 3 dni oz. 2 - 3 hrošče / 10 rastlinah) za zatiranje **repičnega kljunotaja** je bil presežen v sredini meseca marca. Pri **repičarju** pa je ta prag nižji in znaša 5 hroščev/posodo na 3 dni v času nabreklih brstov (BBCH 55).

Rezultati pregledov rumenih lovilnih posod (lokacija: Brege pri Krškem):

Datum	Št. hroščev repičnega kljunotaja	Št. hroščev repičarja
28.3.2022	10	50
24.3.2022	17	113
21.3.2022	0	
18.3.2022	20	
14.03.2022	10	
10.03.2022	4	
07.03.2022	0	
03.03.2022	21	

Uporaba insekticidov je smiselna in smotrna le v primeru, da imate v svojih posevkih presežen prag škodljivosti.

Trenutno so na voljo naslednji registrirani insekticidi:

PRIPRAVEK	ODMEREK	REPIČAR	KLJUNOTAJ	OPOMBE / št. dovoljenih tretiranj
DECIS 100 EC	63 ml/ha	X		K / 1
DECIS 2,5 EC	0,3 L/ha	X		K / 2
DELIX 050 CS	0,1 L/ha	X	X	K / 1
EVURE	0,2 L/ha	X	X	K / 1
KARATE ZEON 5 CS	0,15 L/ha	X	X	K / 2
MAVRIK 240 EW	0,2 L/ha	X	X	K / 1
POLECI	0,3 L/ha	X		K / 2

Hroščki **repičarja** se prehranjujejo s cvetnim prahom. Ker se na posevkih pojavijo že pred cvetenjem lahko do cvetnega prahu pridejo samo na način, da raztrgajo cvetove.

Kljunotaj odlaga jajčeca v vrhne dele stebela, ličinke se nato zavrtajo v notranjost. Steblo oslabi, se deformira in izgubi trdnost. Luski vezani na prizadeti del stebela se slabo razvijajo, semena imajo manjšo maso, lahko pa se tudi popolnoma posušijo.

K: kontaktni pripravek.

Zatiranje glivičnih bolezni

Z napovedanimi padavinami se bodo povečale tudi možnosti okužbe z glivičnimi boleznimi v oljni ogrščici: suha trohnoba stebela ogrščice (*Phoma lingam*), bela zrnata gniloba (*Sclerotinia sclerotiorum*) in črna pegavost (*Alternaria brassicae* spp.).

Na podlagi vremenskih pogojev, zdravstvenega stanja posevka in fenološkega razvoja se odločite za uporabo enega od priporočenih pripravkov.

SREDSTVO	ODMEREK	DELUJE NA	PRIPOROČEN ČAS UPORABE
FOLICUR EW 250 ORIOUS 25 EW	1 L/ha	Zatira: belo gnilobo Zmanjšuje okužbo s: črno listno pegavostjo in suho trohnobo	Od začetka rasti stebela do konca cvetenja (BBCH 30 - 69).
BOUNTY	0,6 L/ha	Zatira: belo gnilobo	Od začetka cvetenja do polnega cvetenja (BBCH 60 - 65).
BUZZ ULTRA DF	0,33 kg/ha	Zatira: belo gnilobo	Od začetka cvetenja do polnega cvetenja (BBCH 60 - 65).
CARAMBA PLEXEO SIRENA	1,2 L/ha	Zmanjšuje okužbe s: suho trohnobo	Od začetka rasti do začetka cvetenja posevka (BBCH 30 - 69)
CHAMANE NORIOS	1 L/ha	Zatira: belo gnilobo Zmanjšuje okužbe s: pegavostmi iz rodu <i>Alternaria</i>	Ko je odprtih 10 % cvetov do konca cvetenja (BBCH 61 - 69)
CUSTODIA	1 L/ha	Zmanjševaje okužb z: belo gnilobo	Ko je odprtih 10 % cvetov do polnega cvetenja (BBCH 61 - 65)
MAVITA 250 EC SCORE 250 EC	0,5 L/ha	Zatira: suho trohnobo in črno listno pegavost	Od začetka razvoja stranskih poganjkov do konca cvetenja (BBCH 21 do 69)
MIRADOR 250 SC ORTIVA TAZER 250 SC ZAFTRA AZT 250 SC	1 L/ha	Zmanjšuje okužb s: črno listne pegavostjo, suho trohnobo in belo gnilobo	Prvi cvetovi odprti, do konca cvetenja (BBCH 60 - 69)
MIRADOR FORTE	1,5 do 2 L/ha	Zatira: črno listno pegavost, suho trohnobo in belo gnilobo	Od začetka rasti stebel do konca cvetenja (BBCH 30 - 69)
PRAKTIS	0,7 L/ha	Zmanjševanje okužb: bela gniloba	od razvojne faze začetka rasti stebela do faze konca cvetenja (BBCH 30 - 69)

PECARI 300 EC PROCER 300 EC PROMINO 300 EC ERA (staro ime TARTAROS 300 EC)	0,6 L/ha	Zmanjšuje okužbe z: suho trohno, belo gnilobo	od razvojne faze ko je 10% cvetov na glavnem grozdu odprtih, glavni grozd se podaljšuje, do konca cvetenja (BBCH 61-69)
PROPULSE	1 L/ha	Zatira: suho trohno in črno listno pegavost Zmanjšuje okužbe z: belo gnilobo	Od 4 razvitega lista, do faze, ko je 30% luskov doseglo končno velikost (BBCH 14 - 73)
PROTENDO 300 EC	0,6 L/ha	Zmanjševanje okužb s: suho trohno Zmanjševanje okužb z: bela gniloba ter črno listno pegavost	od razvojne faze šest listov razvitih do faze rumenega brsta, ko so vidni prvi venčni listi (BBCH 16-59) od razvojne faze začetka cvetenja do faze konca cvetenja (BBCH 61-69)
REYONA	1,5 L/ha	Za zatiranje suhe trohnobe	Od tretjega lista razgrnjenega, do faze, ko so individualni cvetni brsti (glavno socvetje) vidni, vendar še vedno zaprti (BBCH 13-55).
ROYALTY	0,5 kg/ha	Zmanjševanje okužb z: belo gnilobo in črno listno pegavostjo	od razvojne faze pojava socvetja do konca cvetenja (BBCH 55-69)
SISAM	0,8 L/ha	Zatira: belo gnilobo	Ko so odprti prvi cvetovi do konca cvetenja (BBCH 60 - 69)
VELOSTAR	1 L/ha	Za zmanjševanje okužb bele gnilobe in črne listne pegavosti	od začetka cvetenja, ko so prvi cvetovi odprti, do faze konca cvetenja (BBCH 60-69)
TEBUSH 25% EW	1 L/ha	Zatiranje: suhe trohnobe	od pojava cvetnih popkov do polnega cvetenja (BBCH 55-65)
ZENBY	0,8 L/ha	Delno zmanjšuje okužbe: belo gnilobo	Polno cvetenje (BBCH 60 – 65)

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

Datum objave obvestila: 29.03.2022 14:28

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: RODIČ Karmen

Uredila: **Karmen Rodič**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024