



19. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.4 - 07.04.2022 08:21 - Zaključeno



Razvoj jablan je na najbolj ugodnih legah že dosegel fenološko fazo: rožnati popek – socvetja v balonskem stadiju (57 - 59 po BBCH skali).

Sedaj je čas, da se v nasade jablan izobesijo bele lepljive plošče za spremljanje osic **jabolčne grizlice**. Prag škodljivosti je presežen, ko se na eno ploščo skupno ulovi 30 ali več osic. Po cvetenju jablan je potrebno bele lepljive plošče odstraniti, saj se na njih lovijo čebele in drugi koristni organizmi (polonice in tančičarice).

V nasadih že najdemo izleženo jablanovo travno uš, ki ne povzroča večje škode in jo zato ne zatiramo.

V fenološki fazi rdečega balona se prične izleganje **jablanove mokaste uši**. V primeru, da pri pregledu nasada najdete izleženo jablanovo mokasto uš, znaša prag škodljivosti 1 – 2 koloniji na 100 pregledanih cvetnih šopov. V kolikor je ta prag presežen, je mogoče do začetka cvetenja uporabiti pripravke **Tepeki** ali **Afinto** v odmerku 0,14 kg/ha pri porabi vode 500 L na višinski meter krošnje ali **Neemazal T/S** v odmerku 1,5 L/ha na meter višine krošnje in porabi 300 do 500 L vode na ha na meter višine krošnje, pri čemer najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 4,5L/ha.

V mladih nasadih jablan oz. do največje višine krošnje 2 m lahko za zatiranje jablanove mokaste uši uporabite tudi **Sivanto prime** v najvišjem dovoljenem odmerku 0,4 L/ha (0,2 L/ha na m višine krošnje).

Za omejevanje številčnosti populacije **ameriškega kaparja** priporočamo v nasadih jablan in hrušk, kjer je škodljivce prisoten, uporabo pripravka **Harpun** v odmerku 0,5 L/ha, pri porabi od 600 do 1000 L vode na ha. Tretiranje se naj opravi **pred cvetenjem**.

Sredstvo se lahko na jablanah uporabi na istem zemljišču **največ 2x** v eni rastni dobi (če se s sredstvom tretira jablane pred cvetenjem enkrat, je nato za zatiranje jabolčnega zavijača dovoljeno samo eno tretiranje!!!), na hruškah pa **le 1x** v eni rastni dobi.

Trenutno najdemo **rdečo sadno pršico** na jablani v stadiju ličink (najvišji stadij protonimfa). V primeru, da boste pri pregledu listov našli 3-4 ličinke ali več, pri naslednjem škropljenju priporočamo uporabo pripravkov **Zoom 11 SC** v 0,05% (Zaloge v uporabi do 1.8.2022), katerega uporaba je dovoljena največ enkrat v eni rastni sezoni ali **Nissorun 10 WP** v odmerku 0,33 kg/ha na višinski meter krošnje, pri čemer skupni odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha ali **Kanemite SC** v odmerku 0,625 L/meter višine krošnje (največ 1 škropljenje na sezono). Priporočamo škropljenje v večernem ali nočnem času.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 07.04.2022 08:21

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

Seznam registriranih FFS

