

28. OBVESTILO O VARSTVU ŽIT PRED PLEVELI - 11.04.2022 08:57 - Zaključeno



Najugodnejši čas za zatiranje plevelov v žitih je v času razraščanja, do pojava prvega kolena, ko so pleveli še manjši, občutljivejši in jih škropivo lažje doseže. Ozimna žita so sedaj že v kolenčenju, jarine pa večinoma v razraščanju. V priloženem seznamu so navedeni samo registrirani herbicidi, ki jih lahko še sedaj rabimo v ozimnih in jarih žitih. Pred uporabo herbicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI

Ozimne pšenice so v Vipavski dolini sedaj v fazi konca razraščanja do 3. kolena (BBCH 29 - 33), ozimni ječmeni pa v fazi od 1. kolena do zastavičarja (BBCH 31 - 39). Jara žita so v fazi vznika ali razraščanja (BBCH 21 - 25). Posevki so bili zaradi zelo suhih razmer pred dežjem 30.3.2022 v stresu, zato priporočamo pregled posevkov in zaščito proti plevelom sedaj po dežju, ko so semenski pleveli v fazi vznika oz. so vzkalili. Razvoj posevkov in plevelov bo sedaj ob toplejšem vremenu in po dežju zelo hiter. Največ škode v žitih povzročajo trajni pleveli kot so smolenec, njivski slak, osat, ... Gospodarski prag škodljivosti je za smolenec 0,5 rastlin na m², za slak pa 1 rastlina na m². Priporočamo, da plevela zatirate, če je njihova pokrovnost večja kot 10 % in na redkih posevkih. Jarine, posebno oves, so občutljivejše na herbicide, zato je izbira in odmerjanje herbicida zelo važna. Pri herbicidih, kjer smo izpisali opozorilo »kolobarne omejitve«, gre za vpliv ostankov herbicida na setev naslednje kulture npr. lucerne. Podrobnosti so opisane v navodilu o uporabi pod »opozorila« ali »kolobar«. Pri izbiri pripravkov bodite pozorni na razvojno fazo posevka (kolena, zastavičar) in nočne temperature po škropljenju.

Priprava: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

REGISTRIRANI HERBICIDI ZA UPORABO V ŽITIH 2022 – 31.3.2022

(izpuščeni so herbicidi registrirani za uporabo jeseni ali samo zgodaj spomladi)

PRIPRAVEK potek registr.	AKTIVNA SNOV	ODMEREK	ČAS UPORABE	UPORABA NA	DELUJE PROTI/NA	OPOMBE
ALLIANCE Datum veljavnosti: 31.12.2022	Diflufenikan 60% + metsulfuron-metil 6%	100 g/ha	Spomladi: od 3. lista do konca razraščanja BBCH 13 -29	Ozimna: pšenica, ječmen, rž, tritikala	Zatira širokolistne plevela. Vijolica, jetičnik, mrtva kopriva, kamilica, njivska spominčica, poljski nak, rosnica, zebrat , navadna zvezdica, njivski mošnjak, navadna ogrščica, krvomočnica, plezajoča lakota , modri glavinec, navadni srakoperec	
				Jari ječmen, jara pšenica		
ATLANTIS STAR Datum veljavnosti: 1.7.2022	Jodosulfuron 0,9 Mezosulfuron 4,5 tienkarbazon- metil 2,25	0,20 - 0,333 kg/ha	Samo spomladi od 3. listov do faze, ko je 2. kolence največ 2 cm nad 1. kolencem BBCH 13-32	Ozimna pšenica, ozimna tritikala	0,20 kg/ha proti srakopercu , latovkam in za enoletne širokolistne plevela : navadni plešec kamilice, poljski nak, navadna zvezdica, jetičniki, njivska vijolica in mrtve koprive 0,333 kg/ha za ozkolistne	

					plevele: njivski lisičji rep, ljujljke, stoklase, in gluhi oves, ter za širokolistne plevele npr. plezajoča lakota	
ARRAT	Dikamba 50% + tritosulfuron 25%	0,2 kg/ha + močilo (DASH-0,5l/ha)	Od 3. lista do konca razraščanja BBCH 12-29	Ozimna pšenica, ozimni ječmen, jara pšenica, jari ječmen	Enoletni in večletni širokolistni plevel Srhkodlakavi ščir, navadni plešec, metlike, plezajoča lakota , dresni, navadna zvezdica, njivska gorjušica, bela gorjušica, perzijski jetičnik, bržunasti oslez, njivski slak in osat, plazeča zlatica	Ne smemo uporabljati v posevkih, ki so namenjeni pridelavi semen!
AXIAL ONE	Florasulam 0,5% + pinoksaden 4,5%	1 l/ha	Ko so 3 listi razgrnjeni do faze, ko je viden zastavičar BBCH13-39	Ozimna pšenica, ozimni ječmen, jara pšenica, jari ječmen	Enoletni širokolistni in ozkolistni pleveli Plezajoča lakota , kamilica, nav. plešec, nav. zvezdica, njivska spominčica, poljski mak, nav. srakoprec , ljujljka, gluhi(divji) oves, lisičji rep	
AXIAL	pinoksaden 5%	0,6 – 1,2 l/ha	Od treh listov do pojava zastavičarja BBCH13-39	Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen	Enoletni ozkolistni pleveli: gluhi oves, navadni srakoprec , ljujlke, njivski lisičji rep,	plevel naj bo v razvojni fazi 1-6 listov.
BASAGRAN 480	Bentazon 48%	2 l/ha	V fazi od razraščanja do začetka kolenčenja BBCH 12 - 13	Pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala	Zatira širokolistne plevele: njivska pasja kamilica, nav. plešec, ščavjelistna dresen , metlika, pasje zelišče, njivska redkev, njivski mošnjak, kamilica, bela gorjušica	Na plevel deluje v zgodnjih razvojnih fazah
LECTOR DELTA	Diflufenikan 50% Florasulam 5%	0,1 l/ha	Spomladi po vzniku od začetek razraščanja - od 1.stranskega poganjka do, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem (BBCH 21-32)	Ozimna: pšenica, ječmen, rž, tritikala Jarine: pšenica, ječmen, semenske trave	Širokolistni plevel Njivska poljska kamilica, navadni plešec, navadni zebkrat, plezajoča lakota , nadišeča	

					trirobka, njivska spominčica, navadna zvezdnica, njivska gorjušica , njivski mošnjak, njivska vijolica, perzijski jetičnik	
QUELEX	Florasulam 10% Halauksifen-metil 10,42%	50 g/ha	Spomladi, od faze razraščanja do ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem BBCH 21-32	Ozimna pšenica, rž ječmen, pira tritikala, Jari ječmen, pšenica	Širokolistni plevel Ogrščica, plezajoča lakota , kopriva, kamilice, poljski mak, navadna zvezdica, jetičniki, navadno ambrozijo	Ne sme se tretirati rastlin v stresu!
LANCELOT SUPER	Aminopiraliid 30% Florasulam 15%	Ozimni: 33 g/ha Jari: 25 g/ha	Ozimni: od faze začetka razraščanja do faze 2. kolenca BBCH 21-32 Jari: od faze 3. listov do konca razraščanja BBCH 13-29	Ozimna: pšenica, tritikala, rž Jara: pšenica, ječmen	Zatira širokolistne plevele. Navadni plešec, njivski mošnjak, plezajoča lakota , ogrščica , modri glavinec, nedišeča trirobka, poljski mak, navadna zvezdica, navadno sončnico, njivski osat ,	V času tretiranja naj bo od 5 do 25 °C.
BIATHLON 4D	florasulam 5,4% + tritosulfuron 71,4%	70 g/ha (za boljše delovanje lahko dodamo močilo)	Ko so 3 listi razgrnjeni do faze, ko je viden zastavičar BBCH 13 – 39	Ozimna pšenica, ozimni ječmen, jara pšenica, jari ječmen, rž, tritikala, oves, pira	Zatira širokolistne plevele. Plezajoča lakota , pasja kamilica, kamilica, oljna ogrščica, nav. plešec, njivska redkev, njivski mošnjak, njivska gorjušica, modri glavinec, njivska spominčica, srhkodlakavi ščir, nav. ambrozija , nav. konoplja, nav. zebrat , nav. zvezdica, grašice, njivski slak	Sredstva ne nanašati na oslabljene rastline. Tal ne bdelovati 1 teden pred in po tretiranju !
FINY	metsulfuron metil 20%	30 g/ha	Spomladi od začetka razraščanja, ko so vidni 3.poganjki, do zastavičarja BBCH 23-39	Ozimna: pšenica, rž, tritikala	Zatiranje enoletnega širokolistnega plevela Škrlatno rdeča mrtva kopriva, kamilica, poljski mak, njivska gorjušica, navadna zvezdica,	Ne na posevkih v stresu ! Kolobarne omejitve !

					perzijski jetičnik, njivska vijolica, Zmanjšuje: plezajoča lakota in bršljanovolistni jetičnik	
BOUDHA	metsulfuron metil 25% + tribenuron-metil 25%	20 g/ha	Za ozimne spomladi od začetka razraščanja ter do začetka pojava zastavičarja Za jarine od 2. lista do začetka pojava zastavičarja BBCH 12-39	ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu, ozimni tritikali in ozimni rži, v jarem in ozimnem ovsu	Za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela. Sredstvo učinkovito zatira: navadni plešec, žabji kopr, škrlatnordeča mrtva kopriva, poljski mak, navadna zvezdica in njivska vijolica. Sredstvo zmanjšuje zapeleljenosti z : bela metlika in navadni slakovec	Kolobarne omejitve !
DUPLOSAN KV	Mekoprop-P 60%	2 l/ha	Od razraščanja do kolenčenja BBCH 13 - 31	Ozimna pšenica, ozimni ječmen, jara pšenica, jari ječmen - brez podsevkov	Zatira širokolistne plevele: nav. plešec, nav. zvezdica, gorjušice, jetičniki, plezajoča lakota , njivska redkev, poljski mak, njivska spominčica, njivska zlatica Zadovoljivo zatira: metlike, osat, njivski slak, plotni slak, modri glavinec, kamilice, nav. slakovec, njivska mrtva kopriva, dresni	Semenski plevel naj bo v obdobju bujne rasti 2-6 listov, koreninski pa mora biti večji.
DUPLOSAN KV 600	Mekoprop-P 60%	1,5 l/ha	V fazi razraščanja žit BBCH 13-29	Jara pšenica, ječmen, oves, ozimni pšenici, ječmenu, rži, tritikali- brez podsevkov	Zatiranje širokolistnih plevelov: Navadna ogrščica, bela metlika, plazeča lakota , navadni grint, njivska gorjušica, navadna zvezdica, njivski mošnjak, njivski osat, njivska spominčica, kodrolistna kislica	Za tretiranje naj bodo T zraka višje od 12°C
CORIDA	Tribenuron-metil 75%	20 g/ha	Spomladi, od 1. kolenca do faze zastavičarja	Ozimna in jara pšenica, ozimni in	Zatiranje enoletnega	Plevel temeljito

== ADENTIS			BBCH 31-39	jari ječmen	širokolistnega plevla: škrlatno rdeča kopriva, poljski mak, navadni slakovec, njivska gorjušica. Zmanjšuje zapleveljenost: bela metlika in kamilice Tretirati, ko so plevli v fazi intenzivne rasti - razvit 6. list.	omočiti. Na zelo suhih tleh je učinkovitost slabša !
FLEXIDOR	izoksaben 50 50 %	0,25 l/ha	po setvi do faze razvitih 3. listov BBCH 00-13	ozimni pšenici in ozimnem ječmenu	Zatiranje enoletnega širokolistnega plevla: pasjo kamilico, samosevno ogrščico , navadni plešec, dlakavo penušo, mrtvo koprivo, kamilico, poljski mak, ptičjo dresen , navadni slakovec, njivsko zlatico, njivsko redkev in gorjušico , navadno zvezdico, navadni motovilec, jetičnike in vijolico	Ne deluje na že vznikle plevle! Slabo deluje na suhih tleh.
FLAME Datum veljavnosti: 30.6.2022	tribenuron-metil 50%	30 g/ha	Od 3. lista do faze zastavičarja BBCH 13 - 39	Ozimna in jara pšenica, oz. in jari ječmen	Zatira širokolistne plevle: navadna zvezdica do višine 15 cm, navadni repnjakovec, samonikla oljna ogrščica, poljski mak, nedišeča trirobka, njivska spominčica in njivska gorjušica. Sredstvo zmanjšuje: škrlatna rdeča kopriva, navadni plešec	Učinkuje do faze, ko imajo plevli razviti 6 listov. Kolobarne omejitve !
EMCEE Datum veljavnosti: 31.10.2022	MCPA 75%	1,0 l/ha	Ozimna žita od 1. kolenca do zastavičarja- BBCH 31-39; Jara žita od 3. listov do 2. kolenca- BBCH 13-32	Ozimni: pšenica, , rž, ječmen, oves Tritikala; Jara: pšenica, oves ječmen, rž	Zatiranje širokolistnega plevla: Njivski mošnjak, bela metlika; slabše deluje na: navadna zvezdica, poljski mak	Plevli naj bodo v zgodnjih razvojnih fazah in aktivno rastoči
U 46 M-FLUID	MCPA-DMA-94,3%	1l/ha	Od 3. stranskih poganjkov do faze zastavičarja /vidna listna nožnica (BBCH 23 -	Ozimna in jara Pšenica, ječmen, rž, tritikala	Zatira širokolistne plevle- dobro zatira: navadni plešec, njivski	

			39)			slak, preslico, navadno rosnico, krvomočnico, ločje, njivsko mrtvo koprivo, lucemo in koprivo. Zaviralno deluje na: poljski mak, trpotec, zlatico, jetičnik	
ERGON Datum veljavnosti: 31.10.2022	 metsulfuron-metil 6,8% + tifensulfuron-metil 68,2%	70 g/ha 60 g/ha	2 razvita lista pšenice do faze zastavičarja Pšenica od 2 listov, ječmen od 3 listov do začetka pojava zastavičarja BBCH 13 -39	ozimna pšenica jara pšenica, jari ječmen		Enoletni in večletni širokolistni pleveli (dobro delovanje, ko je plevel v fazi 2-6 listov) Nav. ogrščica, nav. plešec, nav. slakovec, bela metlika, nav. zebrat, mrtva kopriva, kamilice, poljski mak, ptičja in breskovolistna dresen, njivska gorjušica , nav. zvezdica, perzijski jetičnik	Ne na durum pšenicah! Učinkovitost je manjša na suhih tleh. Kolobarne omejitve !
GRODYL	Amidosulfuron 75%	40 g/ha	Od faze 3 listov do začetka pojavljanja zastavičarja BBCH 13-37	Pšenica, ječmen, oves, rž, pira, tritikala	za zatiranje širokolistnega plevela: Navadni ščir, plezajočo lakoto , njivsko gorjušico, nav. slakovec, kamilice, nav. plešec, njivsko spominčico, topolistno in kodrastolistno kislico Slabše deluje na škrlatno rdečo mrtvo koprivo, njivsko vijolico, perzijski jetičnik, pasje zelišče, metlike, nav. rosnico	Za boljše delovanje dodamo močilo	
HUSSAR OD Datum veljavnosti: 1.7.2022	Jodosulfuron 10%	0,1 l/ha	V ozimni: od začetka razraščanja do razvoja zgomjega lista BBCH 13 do 37 V jari: od 3. lista do konca razraščanja BBCH 13 - 29	Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, rž, tritikala	Ozkolistni plevel: orjaška šopulja, nav. srakoperec , ljuljka, čužka, enoletna latovka, nav. latovka, Širokolistni pleveli: srhkodlakavi ščir,	Najboljša učinkovitost:ozkolistni pl. v fazi 2 listov do konca razraščan in širokol. pl. v fazi 2-6 listov	

					prava kamilica, loboda, nav. plešec, modri glavinec, bela metlika, njivski osat, zebrat, plezajoča lakota, mrtva kopriva, poljski mak, njiv. redkev in gorjušica, nav. zvezdica, detelja, ...	
HUSSAR PLUS	jodosulfuron 5% + mezosulfuron 0,75%	0,2 l/ha	Od 3 razvitih listov do takrat, ko je 2 kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem BBCH 13 do 32	Ozimna: pšenica, rž, tritikala	za zatiranje enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela: Navadni srakoperec, ljuljka, enoletna latovka, ogrščica, nav. plešec, plezajoča lakota, krvomočnica, prava kamilica, njivska spominčica, poljski mak, nav. zvezdica	S sredstvom lahko tretiramo le ob uporabi traktorske škropilnice. Ozimna žita se lahko tretira le spomladi !
		0,15 l/ha	Od 3 razvitih listov do začetka kolenčenja BBCH 13 do 30	Jara: pšenica ječmen	Gluhi oves, ogrščica, nav. plešec, bela metlika, mrtva kopriva, prava kamilica, nj. spominčica, ptičja dresen, nav. zvezdica, njivski mošnjak, perzijski jetičnik, njivska vijolica	
HUSSAR STAR	Jodosulfuron 3,3% tienkarbazon-metil 2,5%	0,2-0,3 kg/ha + Močilo 1,0 l/ha	Spomladi, od razvojne faze začetka razraščanja žit do faze kolenčenja, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem	Ozimna pšenica, ozimni rž, ozimna tritikala	Enoletni širokolistni in ozkolistni plevel gluhi oves,, poljski mak, njivski osat, poljska ostrožnica, perzijski jetičnik, angleška ljuljka, navadni srakoperec, njivska pasja kamilica, plezajoča lakota, samosevna ogrščica, navadni plešec, navadna zvezdica, njivska spominčica, njivska mrtva kopriva, nedišeča trioba	Samo s traktorsko škropilnico. V brezvetrju
			Ko imajo žita vsaj 2 lista	Ozimna in jara	Enoletni in	Najboljši čas je,

MEZZO	Metsulfuron-metil 20%	20-30 g/ha	oz. ječmen vsaj 3 liste pa do faze razvijanja zastavičarja BBCH 13 39	pšenica, ozimni in jari ječmen, tritikala in oves, Pira	večletni širokolistni plevel Učinkovito zatira: škrlatnordeča mrtva kopriva, prava kamilica, nedišeča trirobka, poljski mak, njivska gorjušica, navadna zvezdica, perzijski jetičnik, njivska vijolica. Zmanjšuje: plezajoča lakota (Galium aparine) in bršljanovolistni jetičnik	ko ima plevel razvitih od 2 do 6 listov. Kolobarne omejitve !
ALLY SX	Metsulfuron-metil 20%	30 g/ha	Ozimne: BBCH 21-39 Jare: BBCH 12-39	Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, tritikala in oves Pira, rž	Enoletni širokolistni plevel: Navadna ogrščica, navadni plešec, bela metlika, navadni zebrat, škrlatno rdeča mrtva kopriva, kamilice, poljski mak, njivska gorjušica, navadna zvezdica, njivski mošnjak, njivska vijolica. Zmanjšuje zapleveljenost: navadna loboda, navadni slakovec, bršljanovolistni jetičnik	Najboljši čas je, ko ima plevel razvitih od 2 do 6 listov. Kolobarne omejitve
HERBOCID XL	2,4D 60%	1,25 l/ha	v razvojni fazi od sredine razraščanja do konca razraščanja BBCH 14-29	Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, ozimni rž, ozimna in jara tritikala	Enoletni in večletni širokolistni plevel njivski osat , njivski mošnjak, navadni plešec, koprive, metlika, plezajoča lakota , slabše zatira: poljski mak, dresni	Tretiranje v brezvetrju, med 5°C in 30°C.
ESTERON Datum veljavnosti: 31.12.2022	2,4-D 2-EHE 90,5%	0,75-1 l/ha	Od konca razraščanja do vidnega 2. kolenca BBCH 22- 32	Ozimna in jara pšenica, ječmen, tritikala	Enoletni širokolistni plevel: Srhkodlakavi ščir, bela metlika, osati , njivski slak , nav. rosnica, poljski mak, v. trpotec, ptičja dresen, nav. slakovec, ščavjelistna dresen , njivska in gorjušica, pasje zelišče, perzijski jetičnik	
MUSTANG 306 SE	2,4-D	0,4-0,6 l/ha	Od začetka razraščanja do	Ozimna pšenica	Zatira	Zatiramo, ko ima

Datum veljavnosti: 31.12.2022	2-EHE 45,242% + florasulam 6,25%		1. kolenca žita BBCH 21-31	in ječmen, jara pšenica in ječmen	širokolistne plevele: metlika, dresni, nav. zvezdica, nav. kurja črevca, prava kamilica, plezajoča lakota, pelinolistna ambrozija; Zmanjšuje zapleveljenost s perzijskim jetičnikom, njivskim osatom in slakom ter večletnimi širokolistnimi pleveli.	enoletni plevel 2- 6 listov
MUSTANG FORTE	2,4-D 18% Aminopirid 1% Florasulam 0,5%	1 l/ha 0,8 l/ha	Ozimine: od začetka razraščanja do 2. kolenca BBCH 21-32 Jarine: od 3. listov do 1. kolenca BBCH 13-32	Ozimna pšenica, ječmen, tritikala, rž Jara pšenica, ječmen, oves	Zatiranje širokolistnega plevela. Bela metlika, njivska pasja kamilica, poljski mak, navadna zvezdica, navadni slakovec, ogrščica, pelinolistna ambrozija , divja vijolica, navadni plešec, plezajoča lakota, njivski osat	Kolobarne omejitve!
PALLAS 75 WG	proksulam 7,5%	120-250 g/ha + močilo (npr. Nu- Film 0,1 l/ha)	Spomladi: od 2 lista do razvojne faze 2. Kolenca BBCH 21 - 32	Ozimna in jara pšenica, rž, tritikala	Zatira ozkolistne in širokolistne plevele: Nav. zvezdica, jetičnik, nav. srakoprec , njivska pasja kamilica, nav. plešec, stoklasi, njivska gorjušica, oves, vijolica, njivski lisičji rep, plezajoča lakota , škrlatno rdeča mrtva kopriva, ljuljka	Tretiramo lahko samo s traktorsko škropilnico. Kolobarne omejitve !
SAVVY	Metsulfuron-metil 20%	30 g/ha	Ko imajo žita razvita 2 lista do faze zastavičarja BBCH 12- 39; Ječmen: 3 liste do faze zastavičarja BBCH 13 - 39	Jara in ozimna: pšenica, ječmen, oves, tritikala	Zatira širokolistne plevele: Nav. Plahitica, nav. ogrščica, nav. plešec, bela metlika, nav. slakovec, nav. zebrat , škrlatno rdeča mrtva kopriva, kamilice, njivska spominčica, poljski mak, ptičja dresni ,	Ne tretirati rastlin, ki so v stresu. Kolobarne omejitve !

					njivska gorjušica, nav. škrbinka, nav. zvezdica, perzijski jetičnik, vijolica	
SEKATOR OD	Amidosulfuron 10% + jodosulfuron 2,5%	0,15 l/ha	Od faze, ko je razvitih 5 stranskih poganjkov do faze, ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad prvim BBCH 25 do 32	Ozimna in jara pšenica, ozimni in jari ječmen, rž, tritikala	Zatira širokolistne plevel: Nav. plešec, glavinec, metlika, zebrat, plezajoča lakota , kamilica, poljski mak, nav. zvezdica, njivski mošnjak Zaviralno deluje proti njivskim osatom , mrtvi koprivi, vijolici, jetičniku, dresnim	Ne uporabljamo na poškodovanih posevkih.
SEKATOR PLUS	2,4-D 28,7% Amidosulfuron 2,5% Jodosulfuron 0,625%	0,6 l/ha	Spomladi, ozimna žita: od razrašč. do 2. kolenca BBCH 21-32 Jara žita: od 3.lista do 2. kol. BBCH13-32	Ozimna in jara pšenica, oz in jari ječmen, oz tritikala, ozimni rž	Širokolistni plevel: Njivska pasja kamilica, samonikla ogrščica, navadni plešec, modri glavinec, plezajoče lakote, škrlatnordeča mrtva kopriva, navadna zvezdica, poljski mak, navadna sončnica, jetičniki	Samo s traktorsko škropilnico!
CORELLO DUO	Florasulam 1,42% Piroksulam 7,08% I	170-265 g/ha + močilo	Po vzniku- spomladi od BBCH 21 do BBCH 31	Ozimna pšenica, ozimni rž, tritikala in pira	Ozkolistni in širokolistni plevel Navadni srakoperec, ljujka, samosevni oves , njivski lisičji rep, stoklase, enoletna latovke, bršljanovolistni jetičnik, perzijski jetičnik, plezajoča lakota , poljski mak, krvomočnica, kamilice, njivska vijolica, navadne zvezdve	
VALENTIA	Florasulam 0,2% Fluroksipir 10%	1,2-1,6 l/ha	Ozimine (razen ovsa) od 3. lista do pozne faze nabrekanja- BBCH 13-45; ozimni oves - od 3. listov do, ko je 1. kolenca BBCH 13-31; Jarine: od 3.listov do faze zastavičarja: BBCH 13-39	Ozimna: pšenica, ječmen, oves, durum pšenica; Jari: ječmen, pšenica, rž, tritikala	Zatiranje enoletnega širokolistnega plevela in večletnega širokolistnega plevela navadni plešec, njivska grašica, kamilice, navadna zvezdica, poljski mak, navadna	

					ogrščica, pasje zelišče, navadni slakovec, modri glavinec, škrlatnordeča mrtva kopriva, plezajočo lakoto, njivski slak, dresni	
SARACEN MAX Datum veljavnosti: 31.12.2022	Florasulam - 20% + Tribenuron-metil 60%	25g/ha	Ozimine - od 2. listov do faze zastavičarja BBCH 12 - 39, Jarine – od 2. Listov do faze ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem BBCH 12 - 32	Ozimni in jari ječmen in oves, ozimna pšenica, rž in tritikala	Zatira širokolistne plevela: navadni slakovec, njivska gorjušica, plezajoča lakota-smolenec , nav. zvezdica nediščica trirobka, nav. plešec, poljski mak, ptičja dresen , breskova dresen , bela metlika, navadni zebrat	Po žetvi se v istem letu lahko na to površino sejejo samo žita,olj.ogrščica, bob in trave. Kolobarne omejitve !
CLYDE FX	Florasulam 0,1% Fluroksipir 10%	1,5 l/ha	Ozimna pšenica, ječmen: BBCH 22-45 Jara pšenica, ječmen: BBCH 22-34 Jari oves:BBCH 23-31 Ozim.rž: BBCH 26-39 Oz. tritikala: 17-32	Ozimine;pšenica, ječmen, rž, tritikala, trda pšenica (durum); Jarine: ječmen, pšenica, oves	Enoletni in večletni širokolistni plevel Plezajoča lakota , navadna zvezdica, kopriva, navadni plešec, kamilice Ozimna trda pšenica: BBCH 29-37	Ne uporabljati na rastlinah, ki so pod stresom zaradi mraza, suše,škodljivcev, pomankanja hranil
STARANE FORTE Datum veljavnosti: 31.10.2022	fluroksipir 33,3 %	0,54 l/ha	od začetek razraščanja do ko je 2. kolence vsaj 2 cm nad 1. kolencem BBCH 21-32	Pšenica, ječmen, oves, tritikala, pira, rž	Sredstvo zatira širokolistne plevela: plezajočo lakoto , navadno zvezdico, breskovo dresen , drobnocvetni rogoviček in njivski slak ;- sredstvo zmanjšuje zapleveljenost z navadnimplotnim slakom.	
BONACA Datum velj: 31.12.2022 = ELTIVIS	Fluroksipir 25%	0,6-0,8 l/ha	od 2 listov do zastavičarja BBCH 12-39	Ozimna pšenica, ozimni ječmen	Zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela Plezajoča lakota , navadna zvezdica, njivski slak . Zmanjša	

					zapeleveljenost: navadni slakovec, bršljanovolistnega jetečnika	
FLUROSTAR 200 Datum veljav.: 31.12.2022	fluroksipir 20%	1 l/ha	Od faze 2 razgmenjenih listov do faze, ko je 1. kolence vsaj 1 cm nad mestom razrašćanja	Ozimna rž in tritikala (BBCH 12-31)	Zatira širokolistne plevele: nav. zvezdica, poljski mak, bršljanolistni jetečnik, plezajoća lakota , nav. plešec, perzijski jetečnik, mrtva kopriva, nj. spominćica, nav. slakovec, nav. rosnica, njiv. mrtva kopriva, nav. grint, kamilica, njiv. gorjušica, njivski mošnjak, njiv. kurja češnjica, njivska redkev	
		0,75 l/ha	Od faze 2 listov do faze zastavićarja	Jara pšenica, jari jećmen (BBCH 12-39)		
FLUROSTAR SUPER 145701-HRAC: 23-1 2	Florasulam - 0,1% Fluroksipir 10%	1,5 l/ha	Od 4. listov do konca razrašćanja BBCH 14 -29	Oziine:pšenicaječmen, rž, tritikala	Širokolistni pleveli: omejuje številćnost plezajoće lakote in navadne zvezdice	
TBM 75 WG	Tribenuron-metil 75%	20 g/ha	Od 2 razvitih listov do faze, ko je 3 kolence 2 cm nad 2. kolencem BBCH 12 - 33	Ozimna in jara pšenica, jećmen, oves, ozimna rž in tritikala	enoletnega širokolistnega plevela: nedišćea trirobka , nav. zvezdica, njivska gorjušica , nav. plešec, poljski mak, ptićja dresen . Omejeno deluje na navadno ambrozijo	Uporabljam, ko je plevel v fazi 2-4 listov
CLAP	Klopirolid 30 %	0,4 L/ha V ozim. in jari rži 0,3 l/ha v jarem jećmenu	Vozimnih žit od razvojne faze tik pred zaćetkom razrašćanja do faze zastavićarja (BBCH 20-39).	Ozimine: pšenica, oves, jećmen, rž in tritikala; jara tritikala, rž in jećmen	za zatiranje širokolistnih plevelov: osatov , kamilic, njivske pasje kamilice, bodićev, modrega glavinca in navadne sonćnice ter za omejevanje številćnosti populacije šćavja Ozimna žita je dovoljeno tretirati le v spomladanskem ćasu!	Na isti površini uporaba sredstva vsake 3 leta! Kolobarne omejitive!
	bensulfuron-metil 50%	0,1 kg/ha	Ozimna žita: zaćetka	Ozimna in jara	Zatiranje	Samo s

XANADU	metsulfuron-metil 4%		razraščanja do faze zastavičarja BBCH 21-39; Jara žita 3.lista do zastavičarja BBCH13-39	pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala	enoletnega širokolistnega plevla Poljski mak, njivska vijolica, nedišeča trirobka, navadna zvezdica, navadni slakovec, škrlatnordečo mrtvo koprivo, ptičja dresen kamilice, navadni plešec, zmanjšuje: plezajoča lakota	traktorsko škropilnico
FLYER	Florasulam 5%	0,15 l/ha samo spomladi 0,1 l/ha	po vzniku 3 listov do faze zastavičarja (BBCH 13-39). v jaremječmenu	Ozime: pšenica, rž, ječmen Jari ječmen	za zatiranje širokolistnega plevla: navadni plešec, plezajočo lakoto , poljski mak, navadni slakovec in navadno zvezdico	

Pred uporabo herbicida obvezno preberite in upoštevajte NAVODILO O UPORABI ! Najugodnejši čas za zatiranje plevelov v žitih je v času razraščanja, do pojava prvega kolenca, ko so plevli še manjši, občutljivejši in jih škropivo lažje doseže.

Ozime pšenice so v Vipavski dolini sedaj v fazi konca razraščanja do 3 kolenca (BBCH 29 - 33), ozimni ječmeni pa v fazi od 1. kolenca do zastavičarja (BBCH 31 – 39). Jara žita so v fazi vznika ali razraščanja (BBCH 21 – 25). Posevki so bili zaradi zelo suhih razmer pred dežjem 30.3.2022 v stresu, zato priporočamo pregled posevkov in zaščito proti plevelom sedaj po dežju, ko so semenski plevli v fazi vznika oz. so vzkalili. Razvoj posevkov in plevelov bo sedaj ob toplejšem vremenu in po dežju zelo hiter.

Največ škode v žitih povzročajo trajni plevli kot so smolenec, njivski slak, osat, .. Gospodarski prag škodljivosti je za smolenec 0,5 rastlin na m², za slak pa 1 rastlina na m². Priporočamo, da plevele zatirate, če je njihova pokrovnost večja kot 10 % in na redkih posevkih.

Jarine, posebno oves, so občutljivejše na herbicide, zato je izbira in odmerjanje herbicida zelo važna. Pri herbicidih, kjer smo izpisali opozorilo »kolobarne omejitve«, gre za vpliv ostankov herbicida na setev naslednje kulture npr. lucerne. Podrobnosti so opisane v navodilu o uporabi pod »opozorila« ali »kolobar«. Pri izbiri pripravkov bodite pozorni na razvojno fazo posevka (kolenca, zastavičar) in nočne temperature po škropljenju.

Priprava: Anka Poženel, univ.dipl.inž.agr.

Datum objave obvestila: 11.04.2022 08:57

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

Seznam registriranih FFS

