



23. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.5 - 14.04.2022 12:40 - Zaključeno



Zgodnje sorte jabolčan (idared, jonagold...), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: socvetja v balonskem stadiju – začetek cvetenja: odprtih okoli 10% cvetov (59-61) po BBCH skali.

Ob zadnjih padavinah smo v Mariboru zabeležili manjši izbruh askospor **jablanovega škrlupa**. Ob naslednjih padavinah lahko pričakujemo, da bodo izbruhi askospor močnejši, zato priporočamo, da škropljenje opravite **še pred napovedanimi padavinami**.

Za škropljenje proti **jablanovemu škrlupu**, priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) metiram (**Polyram DF**) ali pripravkov na osnovi ditianona (**Delan PRO, Alcoban**).

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, ga je potrebno opraviti takoj po končanih padavinah oz. najkasneje v času 24 ur. V tem primeru je mogoče uporabiti enega od naslednjih pripravkov: **Batalion 450 SC** (0,7-1,0 L/ha) ali **Chorus 50 WG** (0,45 kg/ha) ali **Mythos** (1,5 L/ha) ali **Pyrus 400 SC** (1 L/ha) ali **Pyramid** (1,125 L/ha) ali **Faban** (1,2 L/ha) ali **Scala** (1,125 L/ha) ali **Difcor 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Duaxo koncentrat** (1,1 L na višinski meter krošnje/ha, najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha) ali **Mavita 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Score 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Revyona** (2 L/ha). Naštetim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravku Faban.

V ekološki pridelavi je mogoče uporabiti tudi pripravek **Curatio – žvepleno apnena brozga**, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

Proti **jablanovi pepelovki** priporočamo pri temperaturi nad 15°C dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Azumo WG**, **Biotip Sulfo 800 SC**, **Cosan**, **Kumuluf DF**, **Microthiol special**, **Microthiol disperss**, **Pepelin**, **Thiovit jet**, **Vindex 80 WG**, **Vertipin**, **Pol-Sulphur 800 SC** oz. **Symbiotica Fito – tekoče žveplo** v priporočenih odmerkih.

V fenološki fazi »polno cvetenje« je čas, da izobesite **feromonske pasti** za spremljanje **jabolčnega zavijača**.

Sadjarji, ki ste se odločili za uporabo metode zbežanja ali konfuzije za zatiranje jabolčnega zavijača, je sedaj tudi čas za obešanje dispenzorjev **RAK 3** ali **ISOMATE C TT** ali **SemiosNET-Codling Moth** ali **Checkmate puffer CM-Pro..**

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 14.04.2022 12:40

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

Seznam registriranih FFS

