



Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Čebulnice

/ 26. OBVESTILO O VARSTVU ČEBULNIC PRED ŠKODLJIVCI

26. OBVESTILO O VARSTVU ČEBULNIC PRED ŠKODLJIVCI - 26.04.2022 13:21 - Zaključeno



Porova zavrtalka, resarji, čebulna muha

Ob dvigu temperatur v zadnjih dneh, smo pri pregledih nasadov čebule, šalotke, pora in česna na področju Savinjske doline, na širšem Celjskem in Koroškem, zabeležili prve pojave porove zavrtalke (*Phytomyza gymnostoma*). Ta lahko povzroči veliko škode pridelovalcem omenjenih čebulnic. Prisotnost porove zavrtalke prepoznate po nizu vbodov, ki jih na listih pora, čebule,... naredi samica. Žerke najdete v listnih nožnicah pora in pod zunanji listi čebule. Zunanji listi nato porumenijo in sčasoma propadejo.

V nasadih, kjer še niste opazili nobenih vbodov, lahko napad porove zavrtalke preprečite tako, da nasad pokrijete s pokrivko (npr. covertan, lutrasil, agrokoprena, vrteks,...). Na ta način preprečite odraslim zavrtalkam dostop do rastlin in posredno preprečite škodo, ki bi jo povzročile ličinke porove zavrtalke.

Na modrih ploščah v čebulnicah smo ulovili že tudi prve resarje (*Thrips* spp).

Z insekticidoma **Laser 240 SC**, v odmerku 0,45 L/ha, uporaba največ tri krat v eni rastni dobi, ali z **Laser plus** z odmerkom 0,2 L/ha, uporaba največ dva krat v eni rastni dobi, lahko zmanjšujete populacijo tripsov v čebuli in poru, uporaba ob pojavu prvih izleglih ličink oziroma takoj po izleganju jajčec.

V čebuli, šalotki in česnu za zmanjševanje številčnosti populacije cvetličnega resarja-tripsa in za zatiranje čebulne muhe (*Delia antiqua*) lahko uporabite insekticid **Benevia**, v odmerku 0,75 L/ha. **Benevia** deluje na jajčeca in vse razvojne stopnje gosenic, uporaba od razvitega drugega lista čebulnice do začetka zorenja (BBCH 12-80). V čebuli MU, v šalotki MU in v česnu MU lahko za zatiranje resarjev ter drugih grizočih in sesajočih žuželk uporabite insekticid **Karate zeon 5 CS** v odmerku 0,15 L/ha.

Karate zeon 5 CS lahko kot glavno uporabo uporabite na poru za zatiranje listnih uši in drugih grizočih in sesajočih žuželk.

MU = manjša uporaba (»Učinkovitost in fitotoksičnost FFS pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo tega FFS na navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik«).

Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo FFS in ob aplikaciji upoštevajte vse zakonske predpise o varovanju čebel, upoštevajte predpisane varnostne pasove do voda in korenčne dobe!

Datum objave obvestila: 26.04.2022 13:21

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

[Seznam registriranih FFS](#)

