

30. OBVESTILO O ZATIRANJU PLEVELOV V OLJNIH BUČAH - 13.05.2022 12:53 - Zaključeno



Setev oljnih buč se je že pričela v preteklem tednu, padavine omogočajo dobre pogoje za delovanje 'talnih' herbicidov. Pleveli v oljnih bučah lahko zatiramo pred setvijo s plitko zadelavo v tla ali takoj po setvi pred vznikom oljnih buč oz. po vzniku plevelov in buč.

V oljnih bučah so registrirani naslednji herbicidi: Pripravek	Odmerek, čas uporabe	Za zatiranje:
Centium 36 CS (klomazon 36%)	0,25 L/ha, po setvi pred vznikom posevka	Dobro zatira pleveli, kot so npr.: navadna zvezdica (<i>Stellaria media</i>), perzijski jetičnik (<i>Veronica persica</i>), enoletna latovka (<i>Poa annua</i>) in plezajoča lakota (<i>Galium aparine</i>). Zadovoljivo zatira: belo metliko (<i>Chenopodium album</i>), poljski jetičnik (<i>Veronica arvensis</i>), navadno kostrebo (<i>Echinochloa crus – galli</i>) in škrlatno rdečo mrtvo koprivo (<i>Lamium purpureum</i>). Sredstvo ne zatira: navadne rosnice (<i>Fumaria officinalis</i>) in njivske vijolice (<i>Viola arvensis</i>).
Clomate (klomazon)	0,25 L/ha (2,5 mL na 100 m ²), pred vznikom pred vznikom, od razvojne faze suhega semena do faze, ko je drugi pravi list na glavnem steblu v celoti razgrnjen (BBCH 00-12)	za zatiranje nekaterih vrst enoletnega širokolistnega plevela
Successor 600 (petoksamid 60%) Prepovedan na WOI in območjih NUV za vključene v KOPOP.	2 – 4 L/ha, takoj po setvi: najkasneje 3-5 dni po setvi	Sredstvo zatira ozkolistne pleveli, kot so npr.: navadna kostreba (<i>Echinochloa crus-galli</i>), muhviči (<i>Setaria spp.</i>) in enoletna latovka (<i>Poa annua</i>) ter širokolistne pleveli kot so npr.: srhodlakavi ščir (<i>Amaranthus retroflexus</i>), bela metlika (<i>Chenopodium album</i>), drobnocvetni rogovilček (<i>Galinsoga parviflora</i>), kamilice (<i>Matricaria spp.</i>), breskova dresen (<i>Polygonum persicaria</i>) in pasje zelišče (<i>Solanum nigrum</i>).
Flexidor (izoksaben 50%)	oljnih bučah v odmerku od 0,15 – 0,25 L/ha največ 0,75	Priporoča se uporaba takoj po setvi in pred vznikom buč in plevela (BBCH

	L/ha.	00) oziroma najpozneje 3 dni po setvi. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
Fusilade forte (fluazifop-p-butyl 15%) (manjše uporabe)	0,8-1,3 L/ha po vzniku plevelov in buč	za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela, razen enoletne latovke (<i>Poa annua</i>)
Fusilade MAX (fluazifop-p-butyl 2,5%) (manjše uporabe)	1 – 1,5 L/ha po vzniku plevelov in buč	za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega plevela, razen enoletne latovke (<i>Poa annua</i>)
Devrinol 45 FL (napropamid 45%) (manjše uporabe)	v odmerku 2 - 2,5 L/ha (20-25 mL na 100 m ²), tretira se pred setvijo s plitvo vdelavo (inkorporacijo) sredstva na globino 2-5 cm.	za zatiranje nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela
Colzamid (napropamid 45%) (manjše uporabe)	v odmerku 2 - 2,5 L/ha (20-25 mL na 100 m ²), tretira se pred setvijo s plitvo vdelavo (inkorporacijo) sredstva na globino 2-5 cm.	za zatiranje nekaterih vrst enoletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela

Prepovedan na WO I - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih, prepoved velja za vsa kmetijska gospodarstva, ki kmetujejo na WOI.

Prepovedan na NUV - pomeni, da navedene herbicide ni dovoljeno uporabljati na prispevnih območjih vodnih teles podzemnih in površinskih voda po načrtu upravljanja z vodami (NUV) za tista kmetijska gospodarstva, ki so vključena v program KOPOP operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo in Vodni viri.

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO!!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 13.05.2022 12:53
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: **Jože Miklavc**
[Seznam registriranih FFS](#)