



60. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE št. 6 - 15.06.2022 07:08 - Zaključeno



Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejšje v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 69 - 71 (konec cvetenja - nastavek plodiča: mladi plodiči začenejo nabrekati, preostali cvetovi odpadajo).

Za naslednje škropljenje proti peronospori vinske trte priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: **Ampexio** (0,5 kg/ha) ali **Cabrio top** (2 kg/ha) ali **Cymbal** (0,25 kg/ha) ali **Emendo F** (1,5 kg/ha) ali **Enervin** (2,5 kg/ha) ali **Equation pro** (0,4 kg/ha) ali **Folpan Gold** (staro ime Ridomil gold combi pepite, 2,5 kg/ha) ali **Forum star** (1,6 kg/ha) ali **Fytosave** (2 L/ha, za delno zmanjševanje okužb) ali **Magma triple WG** (3 kg/ha) ali **Mikal Flash** (4 kg/ha) ali **Mikal Premium F** (3 kg/ha) ali **Momentum F** (4 kg/ha) ali **Momentum trio** (3 kg/ha) ali **Orondis** (0,32 L/ha) ali **Orvego** (0,8 L/ha) ali **Pergado D** (1,4 L/ha) ali **Pergado F** (3,0 kg/ha) ali **Pergado SC (0,6 L/ha)** ali **Profiler** (3 kg/ha) ali **Reboot** (0,4 kg/ha) ali **Revus** (0,6 l/ha) ali **Sanvino** (0,75 kg/ha) ali **Sfinga Extra WDG** (1,5 kg/ha) ali **Tanos 50 WG** (0,4 kg/ha) ali **Twingo** (3 kg/ha) ali **Valis F** (2 kg/ha) ali **Zorvec Zelavin** (0,32 L/ha).

Priporočamo, da presledki med škropljenji ne bodo daljši kot 8-10 dni.

Uporabiti je mogoče tudi pripravka **LBG-01F34** ali **Sorale LX** v odmerku 4 L/ha (če se uporabljata samostojno) ali 3 L/ha (v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi *folpet*) ali **Foshield** (1-2 L/ha) ali **Delan pro** v odmerku 3 L/ha.

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: **Daimyo F** (2,5 L/ha) ali **Mildicut** (3,0 L/ha) ali **Videryo F** (2,5 L/ha) ali **Vincy F** (2,5 L/ha).

Pripravkom **Cymbal**, **Equation pro**, **Profiler**, **Pergado SC** in **Revus** priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

V **ekološki pridelavi** lahko za zatiranje peronospore uporabite pripravek **Fytosave** ali enega izmed naslednjih bakrovih pripravkov: **Badge WG** ali **Cuprablau Z 35 WG** ali **Cuprablau Z 35 WP** ali **Cuproxat** ali **Kocide 2000** ali **Nordox 75 WG**.

Vremenske razmere za pojav **oidija vinske trte** so trenutno ugodne, zato za preprečitev okužb s to boleznijo priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: **Collis SC** (0,4 l/ha) ali **Custodia** (0,35 L/ha) ali **Difcor 250 EC** (0,12 L/ha) ali **Domark 100 EC** (0,3 L/ha) ali **Dynali** (0,65 l/ha) ali **Folicur EW 250** (0,4 L/ha) ali **Fytosave** (2 L/ha) ali **Karathane Gold 350 EC** (0,6 l/ha) ali **Karbicure** (5 kg/ha) ali **Kusabi 300 SC** (0,25 L/ha) ali **Luna experience** (0,375 l/ha) ali **Luna max** (1 l/ha) ali **Mavita** (0,2 l/ha) ali **Misha 20 EW** (0,23 l/ha) ali **Mystic 250 EC** (0,4 l/ha) ali **Nativo 75 WG** (0,16 kg/ha) ali **Orius 25 EW** (0,4 l/ha) ali **Prosper SC 200** (1 L/ha) ali **Revyona** (2 L/ha) ali **Score 250 EC** (0,2 L/ha) ali **Sercadis** (0,15 L/ha) ali **Spirox D** (0,5 l/ha) ali **Talendo extra** (0,13-0,3 l/ha) ali **Tebusha 25%EW** (0,4 L/ha) ali **Topas 100 EC** (0,3 l/ha) ali **Topaze** (0,3 l/ha) ali **Unicorn DF** (2,2 kg/ha) ali **Vivando** (0,16 l/ha).

Sredstvom za zatiranje **oidija** lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Azumo WG** (4-8 kg/ha) ali **Cosan** ali **Kumulus DF** ali **Microthiol special** ali **Microthiol Disperss** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC** (4 L/ha) ali **Pol-Sulphur 80 WG, WP** (4 kg/ha) ali **Pol-Sulphur 800 SC** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – tekoče žveplo** (4,0 L/ha) ali **Symbiotica fito – granulirano žveplo** (4,0 kg/ha) ali **Vertipin** (5-7,5 L/ha) ali **Cosinus** (8 kg/ha) oziroma **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** (3,6 -8 kg/ha – v primeru pojava oidija).

Trenutno v vinogradih najdemo ličinke prvega (L1), drugega (L2) in tretjega (L3) stadija **ameriškega škrdatka** – prenašalca zlate trsne rumenice.

V PRIMERU POJAVA NEURIJ IN TOČE IMAJO PRI ZAŠČITI VINSKE TRTE PREDNOST PRIPRAVKI, KI VSEBUJEJO A.S. FOLPET: (**Forum star**, **Sfinga extra WDG**, **Pergado F**, **Folpan Gold**, **Mikal flash in podobni**). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so **Protifert LMW**, **Algoplasmin**, **Basfoliar aktiv ali podobnih**. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

Datum objave obvestila: 15.06.2022 07:08

Obvestilo prognošičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MATKO Boštjan

Pripravil: **Boštjan Matko**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024