66. OBVESTILO O VARSTVU KUMAR - 22.06.2022 07:13 - Zaključeno

KUMARNA PLESEN

Pridelovalce vrtnin obveščamo, da se je na kumarah močno povečala možnost okužb s **kumarno plesnijo.** Za preprečitev okužb je mogoče uporabiti sledeče pripravke; **Aliette Flash** (4,0 kg/ha), **Mirador 250 SC** (1 L/ha), **Ortiva** (1 L/ha), **Zaftra AZT 250 SC** (1,0 L/ha), **Champ formula 2 FLO** (2,8 L/ha), **Enervin** (1,5 kg/ha), **Ranman top** (za navadne kumare le v zaščitenih prostorih; kumarice za vlaganje in bučke na prostem ter v zaščitenih prostorih v 0,5 L/ha), **Champion 50 WG** (2,0 kg/ha), **Tanus 50 WG** (na kumaricah za vlaganje in bučkah v zaščitenih prostorih 0,23 kg/ha), **Cuprablau Z 35 WG** (1,5 kg/ha), **Cuprablau Z 35 WP** (1,5 kg/ha), **Cuproxat** (5,3 L/ha), **Polyversum** (0,1 kg/ha) ali **Univerzalni fungicid** (1g/3-10 L vode/100m2). Presledki med škropljenji naj bodo 7 do 10 dnevni.

NAVADNA PRŠICA

Na kumaricah opažamo tudi pojav **navadne pršice (*Teranychus urticae*)**. Integrirano varstvo vključuje metode varstva rastlin z nizkim tveganjem, ki so pri varstvu rastlin pred navadno pršico sledeče:

- Odstranitev plevelov in močno okuženih vrtnin;
- Povišanje vlage z oroševanjem, namakanjem;
- Preventivno: vnos plenilskih pršic v zaščitene prostore;

Prag škodljivost: 2-3 osebki na list. Kemično zatiranje izvedemo pri začetnem pojavu navadne pršice. Za kumarice je v zaščitenih prostorih so registrirani pripravki: **Ortus 5 SC (**0,15% koncentracija, 15 ml na 10 l vode oz. 1,5 l/ha, karenca je 7 dni), **Nissorun 10 WP** (kumare, kumarice za vlaganje, bučke in druge bučnice z užirno lupino; 0,8 kg/ha; za kumarice za vlaganje tudi na prostem), **Nissorun 250 SC** (0,16 – 0,32 L/ha – odvisno od velikosti rastline). Za kumarice in bučke na prostem in v zaščitenem prostoru so registrirani pripravki: **Kanemite SC** (v odmerku 0,625 – 1,25 L/ha, odvisno od velikosti rastline), **Naturalis** (2 L/ha), **Requiem prime** (za zmanjševanje številčnosti, 5L/ha), **Vertimec PRO** v odmerku 1,125 L/ha (11,25 mL/100 m^2) oziroma 75 mL/100 L vode, karenca je 3 dni.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 22.06.2022 07:13
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: Lešnik Leonida
Pripravila: **Leonida Lešnik**
Seznam registriranih FFS