



Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Pečkarji / 76. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

76. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 23.06.2022 14:57 - Zaključeno



V nasadih jablan je premer plodov večji od 40 mm, plodovi so pokončni (spodnja stran plodu in pecelj sta v obliki črke T; razvojne stopnje 74 po lestvici BBCH).

Redno varstvo proti **jablanovemu škrlupu** lahko v teh dneh obnavljate na 10 do 14 dni, oz. prilagodite glede na morebitne padavine. Ob nevihtah z intenzivnimi nalivi (30 in več l/m²), ki hitro izperejo fungicidno oblogo, je potrebno nanos čim prej obnoviti. Priporočamo preventivna sredstva: **CAPTAN 80 WG** (2 kg/ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **MERPLUS** (2 l/ha), **ORTHOCIDE 80 WG** (2 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha). Morebitne okužbe na listih ali plodičih so vir sekundarnih okužb, katere je potrebno nemudoma zaustaviti. Slednje obravnavajte s predhodno navedenimi pripravki, katerim dodate eno od sistemsko delujočih sredstev: **SCORE 250 EC** (0,2 l/ha), **DIFCOR 250 EC** (0,2 l/ha), **MAVITA 250 EC** (0,2 l/ha), **REVVONA** (2,34 l/ha),... V ekološki pridelavi uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENABROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje).

Poganjke okužene z **jablanovo pepelovko** izrezujte in ročno odstranjujte iz nasada. Priporočamo tudi redno dodajanje sredstev na osnovi žvepla (v 3 do 5 kg/ha, oz. l/ha).

Pozorni bodite na **hrušev ožig**. Izražanje bolezenskih znamenj (<https://www.gov.si/teme/hrusev-ozig-erwinia-amylovora/>) bi bilo pričakovati zlasti na območju zahoda Dolenjske (Žužemberk, Trebnje,...) v sadovnjakih jablane, hruške ali kutine, oz. tudi okrasnih gostiteljskih rastlinah (fotinja, šmarna hrušica, japonska kutina, glog, nešplja, panešplja, ognjeni trn, skorš, jerebika,...). V primer suma na okužbo, obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali najbližjo Službo za varstvo rastlin (<http://agromet.mko.gov.si/index.asp?ID=Varstvo/default.asp>).

Številčnost metuljev **jabolčnega zavijača** je v obdobju od prejšnjega obvestila občutno upadla.

Populacije **rdeče sadne pršice** in **navadne pršice** zasledimo v trenutnem obdobju v nasadih prisotne v vseh razvojnih stopnjah. Ob prereznožitvi uporabite: **VERTIMEC PRO** (1,125 l/ha), **SHIRUDO** (0,5 kg/ha), **MILBEKNOCK** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje), **KANEMITE SC** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje).

Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.

Datum objave obvestila: 23.06.2022 14:57

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

