



74. OBVESTILO O VARSTVU PARADIŽNIKA - 24.06.2022 13:51 - Zaključeno



Južna plodovrtka (*Helicoverpa armigera*)

Na plodovih paradižnika gojenem v zavarovanih prostorih opazamo posamezne gosenice **južne plodovrtke**. Pridelovalcem priporočamo, da na pridelovalni površini pozorno spremljamo stanje rastlin.

Pripravek	Odmerek oz. koncentracija	Uporabno	Karenca
AFFIRM	2 kg /ha	Na prostem in v zaščitenih prostorih	3 dni
AGREE WG	0,5 – 1 kg/ha	V zaščitenih prostorih	Ni potrebna
ALVERDE	1 l/ha	V zaščitenih prostorih	1 dan
CORAGEN	175 ml/ha	Na prostem in v zaščitenih prostorih	3 dni
DELFIN WG	0,75 kg/ha	V zaščitenih prostorih	Ni potrebna
KARATE ZEON 5 SC	0,15 l/ha	Na prostem	3 dni
LEPINOX PLUS	1 kg/ha	Na prostem in v zaščitenih prostorih	Ni potrebna
LASER PLUS	0,25 l/ha	Na prostem in v zaščitenih prostorih	3 dni
NEEMAZAL – T/S	2 – 3 l/ha	Na prostem in v zaščitenih prostorih	Ni potrebna
STEWART*	125 g/ha	Na prostem	3 dni
STEWART OPZ*	125 g/ha	V zaščitenih prostorih	10 dni
VOLIAM	175 ml/ha	Na prostem in v zaščitenih prostorih	3 dni

*zaloge v uporabi do: 19.9.2022

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Bodite pozorni na karencu pripravka!

Rjasta paradižnikova pršica (*Aculops lycopersici*), navadna pršica (*Tetranychus urticae*)

Visoke temperature ugodno vplivajo na razvoj pršic med katerimi je zelo nevarna **rjasta paradižnikova pršica**, ki lahko povzroči večjo škodo na paradižniku. Napadene rastline zastajajo v rasti, nadzemni deli pa se značilno obarvajo. Ob prvih znakih napada pršice je prizadete rastline smiselno čim prej odstraniti, saj na ta način omejimo populacijo škodljivca. V zavarovanem prostoru in na prostem škodo omejimo tudi z uporabo registriranih akaricidnih pripravkov.

Pripravek	Odmerek oz. koncentracija	Karenca
VERTIMEC PRO	1,125 l/ha	3 dni
VERTIPIN	7,5 l/ha	3 dni

Poleg paradižnikove rjaste pršice se na pridelovalnih površinah pojavlja tudi **navadna pršica**. Prisotnost škodljivca prepoznamo po pajčevinastem zapredku na listih. Za zatiranje omenjenega škodljivega organizma lahko uporabimo sredstva iz spodnje tabele.

Pripravek	Odmerek oz. koncentracija	Karenca
-----------	---------------------------	---------

VERTIMEC PRO	1,125 l/ha	3 dni
NATURALIS	2 l/ha	Ni potrebna
NISSORUN 10 WP	1 kg/ha	3 dni
NISSORUN 250 SC	rastlina visoka do 50 cm - v odmerku 0,16 l/ha - rastlina visoka med 50 in 125 cm - v odmerku 0,24 l/ha - rastlina višja od 125 cm - v odmerku 0,32 l/ha	3 dni
OROCIDE PLUS	Od 0,4 do 0,8 l/hl, najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči 8 l/ha	1 dan
ORTUS 5 SC	0,15 % pri čemer najvišji odmerek ne sme preseči 1,5 l/ha	7 dni
PREV-GOLD	0,4 l/hl, pri čemer najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči 4 l/ha	1 dan
PREV-GOLD GARDEN	Od 0,4 do 0,8 l/hl, najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme preseči 8 l/ha	1 dan

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! POZOR: uporaba sredstev na osnovi žvepla pri višjih temperaturah lahko privede do fitotoksičnosti! Bodite pozorni na karenco pripravka!

Datum objave obvestila: 24.06.2022 13:51

Obvestilo prognoističnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: Devetak Marko

Pripravil: **Marko Devetak**

[Seznam registriranih FFS](#)

