



## 84. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 07.07.2022 15:09 - Zaključeno



Plodovi jablan presegajo polovico končne velikosti (76 po lestvici BBCH).

Redno varstvo proti **jablanovemu škrlupu** lahko obnavljate na 10 do 14 dni, oz. prilagodite glede na morebitne padavine. Ob nevihtah z intenzivnimi nalivi (30 in več l/m<sup>2</sup>), ki hitro izperejo fungicidno oblogo, je potrebno nanos čim prej obnoviti. Priporočamo preventivna sredstva: **CAPTAN 80 WG** (2 kg/ha), **MERPAN 80 WDG** (1,88 kg/ha), **MERPLUS** (2 l/ha), **ORTHOCIDE 80 WG** (2 kg/ha), **SCAB 80 WG** (1,9 kg/ha), **SCAB 480 SC** (3,13 l/ha), **DELAN PRO** (2,5 l/ha), **DELAN 700 WG** (0,75 kg/ha), **ALCOBAN** (0,75 kg/ha), **POLYRAM DF** (2 kg/ha). V ekološki pridelavi uporabite sredstvo **CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA** (6 l/ha na meter višine krošnje).

Poganjke okužene z **jablanovo pepelovko** izrezujte in ročno odstranjujte iz nasada. Priporočamo tudi redno dodajanje sredstev na osnovi **žvepla** (3 kg/ha, oz. l/ha).

V nasadih se vse pogosteje izražajo znamenja okužb z **listnimi pegavostmi**. Dodatno lahko blažite simptome z **VITISAN** (5 – 7,5 kg/ha), ki učinkuje tudi proti **mušji pegavosti**.

Pozorni bodite na **hrušev ožig**. Izražanje bolezenskih znamenj (<https://www.gov.si/teme/hrusev-ozig-erwinia-amylovora/>) bi bilo pričakovati zlasti na območju zahoda Dolenjske (Žužemberk, Trebnje,...) v sadovnjakih jablane, hruške ali kutine, oz. tudi okrasnih gostiteljskih rastlinah (fotinja, šmarna hrušica, japonska kutina, glog, nešplja, panešplja, ognjeni trn, skorš, jerebika,...). V primer suma na okužbo, obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali najbližjo Službo za varstvo rastlin (<http://agromet.mko.gov.si/index.asp?ID=Varstvo/default.asp>).

Pridelovalce obveščamo, da se povečuje nalet metuljev drugega rodu **jabolčnega zavijača**. Priporočamo: **AFFIRM** (največ 4 kg/ha), **AFFIRM OPTI** (2 kg/ha), **DELEGATE 250 WG** (0,3 kg/ha; le 1× v rastni dobi), **LASER PLUS** (0,3 l/ha; le 1× v rastni dobi), oz. **MADEX MAX** (50 ml/ha na 1 m višine krošnje) ali **CARPOVIRUSINE** (1 l/ha). Slednji trije so primerni tudi v ekološki pridelavi. V primeru prereznožitve **listnih uši**, lahko uporabite pripravek **MOSPILAN 20 SG** (v 0,04 % konc., oz. 4 g na 10 l vode), ki stransko deluje tudi na zavijače.

Izvedba zaščite je smiselna zlasti iz vidika množičnosti naleta **drugih vrst zavijačev**. Izstopa drugi rod **breskovega zavijača** in občasno pojavljanje **koruzne vešče**. Zoper slednje lahko uporabite še sredstva na osnovi *Bacillus thuringiensis*: **LEPINOX PLUS** (1 kg/ha), **DELFIN WG** (0,75 kg/ha) ali **AGREE** (1 kg/ha).

Populacije **rdeče sadne pršice** in **navadne pršice** zasledimo v prisotne v vseh razvojnih stopnjah. Ob prereznožitvi uporabite: **VERTIMEC PRO** (1,125 l/ha), **SHIRUDO** (0,5 kg/ha), **MILBEKNOCK** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje), **KANEMITE SC** (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje).

**Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrast.**

**Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.**

Datum objave obvestila: 07.07.2022 15:09

Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Objavil/a: BAJEC Domen

Pripravil: **Domen Bajec**

Seznam registriranih FFS

