



79. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št. 10 - 18.07.2022 13:44 - Zaključeno



Večina sort vinske trte je trenutno v fenološki fazi BBCH 79-81 (večina jagod se med seboj dotika - začetek sortno značilnega barvanja).

Nevarnost okužb s **peronosporo vinske trte** še ni minila. Za naslednja škropljenja priporočamo uporabo enega izmed kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: **Ampexio** (0,5 kg/ha), **Cymbal** (0,25 kg/ha), **Enervin** (2,5 kg/ha), **Equation pro** (400 g/ha), **Fortuna gold** (3 kg/ha), **Forum star** (1,6 kg/ha), **Fytosave** 2 L/ha, za delno zmanjševanje okužb), **Mikal Flash** (4 kg/ha), **Mikal premium F** (3 kg/ha), **Momentum F** (4 kg/ha), **Momentum trio** (3kg/ha), **Orvego** (0,8 L/ha), **Pergado F** (3 kg/ha), **Pergado D** (1,4 L/ha), **Pergado SC** (0,6 L/ha), **Reboot** (0,4 kg/ha), **Revus** (0,6 l/ha), **Sanvino** (1,5 kg/ha), **Sfinga Extra WDG** (1,5-2 kg/ha), **Tanos 50 WG** (0,4 kg/ha, zaloge v uporabi do 16.9.2022), **Twingo** (3 kg/ha) ali **Valis F** (2 kg/ha). Presledki med škropljenji so lahko dolgi 12-14 dni, v primeru obilnejših padavin pa jih je potrebno skrajšati.

Uporabiti je mogoče tudi kombiniran pripravek z bakrom **Pergado C** (4–5 kg/ha) ali pripravka **Foshield** (kalijeve fosfanati, 4 L/ha) ali **Delan pro** (ditianon in kalijeve fosfanati, 3 L/ha).

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: **Daimyo F** (2,5 L/ha) ali **Mildicut** (4 L/ha) ali **Videryo F** (2,5 L/ha) ali **Vincy F** (2,5 L/ha).

Pripravkom **Cymbal**, **Equation pro**, **Pergado SC** in **Revus** priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

V **ekološki pridelavi** lahko za zatiranje peronospore uporabite **Fytosave** ali enega izmed naslednjih bakrovih pripravkov: **Badge WG** ali **Cuprblau Z 35 WG** ali **Cuprblau Z 35 WP** ali **Cuprblau Z 50 WP** ali **Cuproxat** ali **Kocide 2000** ali **Nordox 75 WG**.

Za preprečitev okužbe z **oidijem vinske trte** priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: **Collis SC** (0,4 l/ha), **Custodia** (0,7 L/ha), **Domark 100 EC** (0,3 L/ha), **Difcor 250 EC** (0,12 L/ha), **Dynali** (0,65 l/ha), **Folicur EW 250** (0,4 L/ha), **Fytosave** (2 L/ha), **Karathane Gold 350 EC** (0,6 l/ha), **Karbicure** (5 kg/ha), **Kusabi 300 SC** (0,3 L/ha), **Mavita 250 EC** (0,2 l/ha), **Misha 20 EW** (0,23 l/ha, zaloge v uporabi do 30.11.2022), **Mystic 250 EC** (0,4 l/ha), **Nativo 75 WG** (0,16 kg/ha), **Orius 25 EW** (0,4 l/ha), **Prosper CS 300** (1 L/ha), **Revyona** (2 L/ha), **Score 250 EC** (0,2 L/ha), **Sercadis** (0,15 L/ha), **Sythane 20 EW** (0,14 L/ha, zaloge v uporabi do 30.11.2022), **Tebusha 25%EW** (0,4 L/ha), **Topas 100 EC** (0,3 l/ha), **Topaze** (0,3 l/ha), **Unicorn DF** (2,2 kg/ha) ali **Vitisan** (12 kg/ha).

Lahko uporabite tudi pripravek **Universalis** (2 L/ha), ki zaradi kontaktne komponente deluje tudi proti peronospori vinske trte.

Sredstvom za zatiranje **oidija** lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: **Azumo WG** (4-8 kg/ha) ali **Cosan** ali **Kumulus DF** ali **Microthiol special** ali **Microthiol Disperss** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali **Vertipin** (5 – 7,5 L/ha). V primeru visokih dnevnih temperatur zraka (nad 25°C) je treba tretirati zjutraj.

V primeru pojava **neurij in toče** imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (**Forum star**, **Sfinga extra WDG**, **Pergado F** in podobni). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so **Protifert LMW**, **Algoplasmin** ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

Datum objave obvestila: 18.07.2022 13:44

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: Lešnik Leonida

Pripravila: **Leonida Lešnik**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024