




Celjska in Koroška regija - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije / Krompir

/ 104. OBVESTILO O SUŠENJU (DESIKACIJI) KROMPIRJEVE CIME PRED IZKOPOM KROMPIRJA

104. OBVESTILO O SUŠENJU (DESIKACIJI) KROMPIRJEVE CIME PRED IZKOPOM KROMPIRJA - 28.07.2022 11:20 - Zaključeno



1 SUŠENJE (DESIKACIJA) KROMPIRJEVE PRED IZKOPOM KROMPIRJA

Najmanj dva tedna pred predvidenim izkopom lahko opravite desikacijo - krompirjevko lahko poškropite s herbicidi: **Reglone 200 SL** (a.s. dikvat), ki ima **Dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin, dovoljena uporaba od 1.6.2022 do 28.9.2022**, ali s herbicidom **Beloukha** (a.s. pelargonska kislina).

Herbicide **Reglone 200 SL** se uporablja kot kontaktni neselektivni herbicide na semenskem in jedilnem krompirju za sušenje (desikacijo) krompirjevke. Sredstvo deluje na zelene dele rastlin krompirja in že v nekaj dneh posuši krompirjevko. **Reglone 200 SL** se za sušenje krompirjevke **jedilnega krompirja** uporablja v odmerku 2,5 L/ha (25 ml na 100 m²), **za sušenje krompirjevke semenskega krompirja** v odmerku 4 L/ha (40 ml na 100 m²), vedno ob porabi vode 300-400 L/ha, odvisno od bujnosti krompirjevke. Desikacijo z Reglonom 200 SL je potrebno opraviti v jasnem, suhem in ne prevročem vremenu. Tla ne smejo biti zasičena z vlago!

OPOZORILA: S sredstvom Reglone 200 SL se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Tretiranje se lahko izvaja le s traktorji z zaprto kabino. Pri tretiranju je obvezna uporaba šob za 50 % zmanjšanje zanosa. Karenca za krompir je 10 dni. Delovna karenc: Vstop na tretirano površino je prepovedan 24 ur po tretiranju. Nezaščitene osebe nimajo vstopa na škropljeno območje najmanj 3 dni! Obvezno je vodenje evidence uporabe FFS!

Beloukha se v krompirju uporablja za sušenje krompirjevke v odmerku 16 L/ha, priporočena poraba vode je 200-400 L/ha. Krompirjevko se tretira, ko imajo gomolji želeno debelino oziroma najpozneje 14 dni pred izkopom krompirja. S sredstvom se lahko tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni v razmiku 5-7 dni. Krompirjevko se 1 dan pred uporabo sredstva Beloukha zmulči na višino 15-20 cm. Predhodno mulčenje je potrebno, da aktivna snov (pelargonska kislina) lažje proдре v listno maso. Uporaba sredstva v krompirju omogoči enakomernije dozorevanje pridelka, lažje ločevanje cime od gomoljev, olajšan strojni izkop in manj umazan pridelek. Kožica gomoljev je čvrstejša, kar pomeni manj poškodb med izkopom in manj okužb gomoljev s krompirjevo plesnijo. Karenca za Beloukha za krompir je zagotovljena s časom uporabe!

Pred uporabo navedenih FFS pozorno preberite priložena navodila za uporabo in opravite desikacijo v skladu s predpisanimi navodili!

Na krompiriščih, kjer krompirjevko mehansko kosite, le to čim prej po košnji odstranite z njiv in počakajte z izkopom vsaj 14 dni, da kožica na krompirjevih gomoljih pred spravilom postane bolj čvrsta.

Datum objave obvestila: 28.07.2022 11:20

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: SILVO Zveplan

Pripravil: **Silvo Zveplan**

Seznam registriranih FFS

