

81. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.11 - 02.08.2022 14:15 - Zaključeno



Zgodnje sorte vinske trte so trenutno v fenološki fazi barvanja oz. mehčanja jagod (BBCH 83 – 85), medtem ko so pozne sorte v fenološki fazi: BBCH 79-81 (večina jagod se med seboj dotika - začetek sortno značilnega barvanja).

Za zaključna škropljenja proti **peronospori vinske trte** priporočamo uporabo enega od bakrovih pripravkov, kot so: **Badge WG** (2,5 kg/ha), **Cuprablau Z 35 WG** (3 kg/ha), **Cuprablau Z 35 WP** (3 kg/ha), **Cuprablau Z 50 WP** (2 kg/ha), **Kocide 2000** (2,0 kg/ha), **Cuproxat** (5,3 L/ha) ali **Nordox 75 WG** (1,6 kg/ha).

Pri uporabi bakrovih pripravkov lahko na 'aromatičnih' sortah (npr. Sauvignon) vinske trte po podatkih iz strokovne literature prihaja do vpliva na arome. Zato lahko namesto bakrovih pripravkov proti peronospori vinske trte uporabite pripravke, ki imajo krajšo karenčno dobo, kot npr.: **Ampexio** (0,5 kg/ha) ali **Cymbal** (0,25 kg/ha) ali **Daymio F** (2,5 L/ha) ali **Follow 80 WG** (1,25 kg/ha) ali **Fosshield** (4 L/ha) ali **Fytosave** (2 L/ha) ali **Mildicut** (4 L/ha) ali **Pergado F** (3 kg/ha) ali **Pergado SC** (0,6 L/ha), **Reboot** (0,4 kg/ha) ali **Sfinga extra WDG** (2 kg/ha), **Tanos 50 WG** (4 kg/ha), **Twingo** (3 kg/ha), **Videryo F** (2,5 L/ha) ali **Vincya F** (2,5 L/ha).

Pripravkoma **Cymbal** in **Pergado SC** priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

Proti **oidiju vinske trte** lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi žvepla, kot so: **Azumo WG** (4-8 kg/ha) ali **Cosan** ali **Kumulus DF** ali **Microthiol special** ali **Microthiol Disperss** ali **Pepelin** ali **Thiovit jet** ali **Vindex 80 WG** v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali **Biotip Sulfo 800 SC** (4 L/ha) ali **Pol-Sulphur 80 WG, WP** (4 kg/ha) ali **Symbiotica fito – granulirano žveplo** (4,0 kg/ha) ali **Vertipin** (5-7,5 L/ha) ali **Cosinus** oziroma **Cosavet DF** ali **Močljivo žveplo Karsia DF** (8 kg/ha – v primeru pojava oidija). **Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti.** V primeru močnejšega pojava oidija lahko uporabite pripravek **Karathane Gold 350 EC** (0,6 L/ha).

V primeru napovedi pojava večdnevni padavin se pred začetkom padavin pri sortah, ki so v fenološki fazi »začetek mehčanja jagod« priporoča uporaba »botriticidov« proti **sivi grozdni plesni – botritisu ob upoštevanju karenčne dobe**: **Amylo-X** (1,5 – 2,5 kg/ha), **Cantus** (1,2 kg/ha), **Karbicure** (5 kg/ha), **Mythos** (2,5 L/ha), **Oroside plus** (6,4 L/ha), **Prev-gold** (6,4 L/ha), **Prolectus** (1,2 kg/ha), **Pyrus 400 SC** (2 L/ha), **Scala** (2 L/ha), **Serenade ASO** (4 L/ha, uporaba do 4 krat letno), **Switch 62,5 WG** (1 kg/ha), **Taegro** (0,37 kg/ha), **Teldor SC 500** (1,5 L/ha) ali **Zenby** (1,5 L/ha) ali pripravki **Botector** (1 kg/ha), **Polyversum** in **Universalni fungicid** (oba 0,25 kg/ha); ki se lahko na istem zemljišču uporabijo 3-4 krat v eni rastni dobi in sicer v razvojni fazi, ko je odpadlo 80% cvetnih kapic do razvojne faze, ko se jagode mehčajo). Pri uporabi botriticidov priporočamo škropljenje samo v coni grozdja (v tem primeru zadostuje polovični odmerek), pri čemer mora biti cona grozdja dobro omočena.

V primeru pojava neurij in toče v tem času priporočamo uporabo enega od zgoraj naštetih **bakrovih pripravkov** ter dodajanje foliarnih gnojil kot so **Protifert LMW**, **Algoplasmin** ali podobni. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Opozarjamo na dosledno upoštevanje karenčne dobe za posamezne kemične pripravke.

Karenčne dobe za priporočene pripravke znašajo:

Badge WG – 21 dni, Cuprablau Z 50 WP – 21 dni, Cuprablau Z 35 WP, WG – 21 dni, Cuproxat – 21 dni, Nordox 75 WG – 21 dni, Kocide 2000 – 21 dni, Ampexio – 21 dni, Cymbal – 7 dni, Daymio F – 28 dni, Follow 80WG – 28 dni, Fosshield – 14 dni, Fytosave – 3 dni, Mildicut – 21 dni, Pergado F – 28 dni, Pergado SC – 21 dni, Reboot – 28 dni, Sfinga extra WDG – 28 dni, Tanos 50 WG – 28 dni, Twingo – 28 dni, Videryo F – 28 dni, Vincya F – 28 dni, Žvepla – 28 dni razen Pol-Sulphur 80 WG, WP, Symbiotica fito – granulirano žveplo in Vertipin - 5 dni, Karathane Gold 350 EC – 21 dni.

Amylo-X – karenca ni potrebna, Botector – zagotovljena s časom uporabe, Cantus WG – 28 dni, Karbicure – 1 dan, Mythos – 21 dni, Oroside plus, Prev-gold – 1 dan, Prolectus – 14 dni, Pyrus – 35 dni, Scala – 21 dni, Serenade ASO - karenca ni potrebna, Switch 62,5 WG – 21 dni, Taegro – 1 dan, Teldor SC 500 – 14 dni, Zenby – 21 dni, Polyversum in Universalni fungicid- 1 dan

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 02.08.2022 14:15

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UVHVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024