

116. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 04.11.2022 12:15 - Zaključeno



Pavje oko

V posameznih oljčnikih opažamo zmeren pojav glivične bolezni pavje oko. Na bolezen sta zelo občutljivi sorti Istrska belica in Oblica.

Oljkarjem, ki imajo oljčnike okužene z omenjeno boleznijo svetujemo, da naj **po končanem obiranju oljk**, oljčnike temeljito poškopirajo. Priporočamo predvsem uporabo enega izmed organskih fungicidov:

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK	KARENCA
- dodin	Syllit 400 SC	2,25l/ha	Ču
- tebukonazol + trifloksistrobin	Nativo 75 WG	0,25 kg/ha	Ču
- difenkonazol	Score 250 EC	0,5 l/ha	30

Vse lahko uporabimo v sklopu integrirane pridelave oljk.

V okviru ekološke in integrirane pridelave oljk lahko uporabimo enega izmed bakrovih oziroma bioloških pripravkov:

AKTIVNA SNOV	FFS	ODMEREK	KARENCA
- bakrov oksiklorid	Cuprblau-Z 35 WG	1.6-2 kg/ha	14 dni
- bakrov oksiklorid	Cuprblau-Z 35 WP	2 kg/ha	14 dni
- bakrov oksid	Nordox 75 WG	1,25 kg/ha	14 dni
- Bacillus amyloliquefaciens	Serenade ASO	8 l/ha	Ni potrebna
- Bacillus amyloliquefaciens	Taegro	0,185-0,37 kg/ha	1 dan

Opozorilo! Škopljenje z bakrovimi pripravki moramo izvesti v karseda toplem in suhem vremenu. Ob povečani vlažnosti in nizkih temperaturah lahko uporaba bakrovih pripravkov povzroči pojav fitotoksičnosti, kar v praksi pomeni intenzivno odpadanje okuženih in od mraza poškodovanih listov. Posledica odpadanja listov je manjša rodnost v naslednjem letu!

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Pripravil: Matjaž Jančar

Datum objave obvestila: 04.11.2022 12:15

Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Objavil/a: JANČAR Matjaž

Pripravil: **Matjaž Jančar**, tel.: 05 630 40 60

[Seznam registriranih FFS](#)

