

2. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN - 21.02.2023 11:34 - Zaključeno



Breskve in nektarine, ki rastejo predvsem na lažjih in peščenih tleh v mestu ter na najbolj ugodnih, toplih oz. sončnih legah, so že dosegle fenološko fazo nabrekanja cvetnih brstov-odpiranja brsta (BBCH 51-53).

V fenološki fazi brstenja je nevarnost okužbe breskev in nektarin z **breskovo kodravostjo** velika, še posebej, če po toplem obdobju nastopi deževno vreme. **Breskova kodravost** je gospodarsko najpomembnejša bolezen breskev in pojav te bolezni ni mogoče napovedati, zato škropimo drevesa breskev in nektarin **preventivno**.

Pričakujemo da bodo prve okužbe z breskovo kodravostjo možne ob prvih napovedanih padavinah, še posebej če bodo temperature zraka v času padavin nad 8 °C, zato je potrebno breskve in nektarine poškropiti **tik pred napovedanimi padavinami**.

V primeru ohladike vremena in padca nočnih temperatur pod 0 °C se škropljenje opravi šele po ponovni otoplitvi (nočne temperature nad 0 °C) zaradi preprečitve morebitnih ožigov.

Za prvo škropljenje proti **breskovi kodravosti** in **listni luknjičavosti koščičarjev** priporočamo uporabo pripravkov na osnovi bakra:

Pripravek	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha (le listna luknjičavost)
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2,0 kg/ha (le listna luknjičavost) 3,0 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	
Nordox 75 WG	2,0 kg/ha (le breskova kodravost)

PRED UPORABO POSAMEZNEGA FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA JE POTREBNO PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO !!!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 21.02.2023 11:34

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: MEŠL Miro

Pripravil: **Miro Mešl**

[Seznam registriranih FFS](#)

