

8. OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV, NEKTARIN in MARELIC - 06.03.2023 13:41 - Zaključeno



V fenološki fazi brstenja je nevarnost okužbe breskev in nektarin z **breskovo kodravostjo** velika, še posebej, če po toplem obdobju nastopi deževno vreme. **Breskova kodravost** je gospodarsko najpomembnejša bolezen breskev in pojav te bolezni ni mogoče napovedati, zato škropimo drevesa breskev in nektarin **preventivno**.

Pričakujemo da bodo prve okužbe z breskovo kodravostjo možne ob prvih napovedanih padavinah, še posebej če bodo temperature zraka v času padavin nad 8 °C, zato je potrebno breskve in nektarine poškropiti **tik pred napovedanimi padavinami**.

V primeru ohladike vremena in padca nočnih temperatur pod 0 °C se škropljenje opravi šele po ponovni otoplitvi (nočne temperature nad 0 °C) zaradi preprečitve morebitnih ožigov.

Za prvo škropljenje proti **breskovi kodravosti** in **listni luknjičavosti koščičarjev** priporočamo uporabo pripravkov na osnovi bakra:

Pripravek	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha (le listna luknjičavost)
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2,0 kg/ha (le listna luknjičavost) 3,0 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	
Nordox 75 WG	2,0 kg/ha (le breskova kodravost)

Drevesa **marelic**, ki rastejo na zavetnih legah imajo prav tako že nabrekle brste. Za zatiranje **listne luknjičavosti koščičarjev** na **marelicah** priporočamo uporabo bakrovega pripravka:

Pripravek	Odmerek
Badge WG	3,5 kg/ha
Cuprablau Z 35 WG	1,6-2 kg/ha
Cuprablau Z 35 WP	2 kg/ha

Drevesa naj bodo temeljito poškropljena.

V letošnjem letu ima **DOVOLJENJE ZA NUJNE PRIMERE**, za zatiranje okužb z breskovo kodravostjo in listno luknjičavostjo koščičarjev, sredstvo CURATIO, in sicer na:

- BRESKVAH za zatiranje okužb z breskovo kodravostjo (*Taphrina deformans*), breskovo pepelovko (*Sphaerotheca pannosa*) in listno luknjičavostjo koščičarjev (*Stigmia carpophila*) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje;

- MARELICAH za zatiranje okužb z marelično pepelovko (*Podosphaera tridactyla*) in listno luknjičavostjo koščičarjev (*Stigmia carpophila*) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje;

OPOZORILO: Sredstvo Curatio smejo uporabljati samo poklicni pridelovalci koščičastega sadja, ki so registrirani za **EKOLOŠKO PRIDELAVO!**

PRED UPORABO POSAMEZNEGA FITOFARMACEVTSKEGA SREDSTVA JE POTREBNO PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO !!!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Datum objave obvestila: 06.03.2023 13:41

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: Lešnik Leonida

Pripravila: **Leonida Lešnik**

[Seznam registriranih FFS](#)



MKGP-UHVVR | Izjava o dostopnosti | FITO-INFO | NEOX s.p., 2014 | BRON d.o.o. © 2024