

## 3. VARSTVO MARELIC - 09.03.2023 08:18 - Zaključeno

Cvetna monilija (*Monilinia laxa*)

Na JV dela Celjske regije zgodnje sorte marelic prehajajo iz fenološke faze rdečega popka v fazo stadija balona do prvega odprtega cvetova (BBCH 57 – 59 – 60). Na ostalih opazovanih lokacij območja Celjske in Koroške regije so marelice v povprečju na opazovane lokacije v fenološki fazi odpiranja brsta (BBCH 53).

Glede na napoved toplega in nestanovitnega vremena opravite škropljenje proti **cvetni moniliji**, ko bo odprtih 10 % cvetov. Uporabite enega od pripravkov, ki so navedeni v preglednici.

| Pripravek      | Odmerek (koncentracija)                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Chorus 50 WG   | 0,5 kg/ha                                                              |
| Prolectus      | 330 g na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha      |
| Revyona        | 1,8 L/ha                                                               |
| Signum         | 0,25 kg na 1 m višine krošnje/ha, najvišji dovoljen odmerek 0,75 kg/ha |
| Switch 62,6 WG | 0,08%, najvišji dovoljen odmerek 1 kg/ha                               |
| Zenby          | 0,9 L/ha                                                               |
| Amylo-X        | 1,5 do 2,5 kg/ha                                                       |
| Serenade ASO   | 8 L/ha                                                                 |
| Prestop        | 0,2-0,4 % oz. 2 kg/ha                                                  |

Pripravki na osnovi mikroorganizmov Amylo-X, Serenade ASO in Prestop imajo dovoljenja za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

Datum objave obvestila: 09.03.2023 08:18

Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus

Pripravila: **Alenka Ferlež-Rus**

Seznam registriranih FFS

