



12. Spomladansko škropljenje jagod - 13.03.2023 09:56 - Zaključeno



Spomladansko škropljenje jagod izvajamo v začetku rasti oziroma takoj po čiščenju nasada. Proti pepelasti plesni (*Sphaerotheca macularis*, (sin. *Podosphaera aphanis*)) svetujemo uporabo žeplovih pripravkov, ki imajo stransko delovanje tudi na pršico. Pri uporabi žeplovih pripravkov naj bo temperatura za učinkovito delovanje vsaj 15 °C. Po pregledu nasadov smo ugotovili, da so se pričele pojavljati tudi sovke in druge gosenice metuljev. Pred škropljenjem preglejte nasade.

Žepovi pripravki registrirani na jagodah: **Biotip sulfo 800 SC** (manjše uporabe), **Thiovit Jet**, **Vertipin**.

Za sovke in druge gosenice so registrirani naslednji pripravki: **Affirm**, **Agree WG** (manjše uporabe), **Azatin EC**, **Benevia**, **Lepinox Plus**.

Pred uporabo preverite odmerke in količino vode. Pozorni bodite tudi ali so sredstva registrirana na prostem ali v zaščitnih prostorih.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Napisala: Urška Škrabar

Datum objave obvestila: 13.03.2023 09:56

Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Objavil/a: Lešnik Leonida

Pripravila: **Leonida Lešnik**

[Seznam registriranih FFS](#)

